# Цель Т



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания гомеопатические*** круглые, плоскоцилиндрические, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, возможно наличие желтых или серых вкраплений; запах практически отсутствует.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| Cartilago suis (картиляго суис) D4 | 300 мкг |
| Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D4 | 300 мкг |
| Embryo totalis suis (Embryo suis) (эмбрио тоталис суис (эмбрио суис)) D4 | 300 мкг |
| Placenta totalis suis (Placenta suis) (плацента тоталис суис (плацента суис)) D4 | 300 мкг |
| Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (Токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D2 | 540 мкг |
| Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D1 | 600 мкг |
| Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2 | 150 мкг |
| Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D8 | 150 мкг |
| Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис (сангвинариа)) D3 | 450 мкг |
| Sulfur (сульфур) D6 | 540 мкг |
| Nadidum (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) (надидум (никотинамид-аденин-динуклеотид)) D6 | 30 мкг |
| Coenzym A (коэнзим А) D6 | 30 мкг |
| Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D6 | 30 мкг |
| Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6 | 3 мг |
| Acidum DL-α-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D6 | 30 мкг |

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

## Показания к применению:

— артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз;

— плечелопаточный периартрит.

## Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Спондилоартрит

## Противопоказания:

— возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных;

— недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные.

## Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах - 5-10 недель; при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите - около 4 недель.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием, препарата и проконсультироваться с врачом.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

## Особые указания и меры предосторожности:

В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию с врачом, возможно включение в схему лечения других лекарственных форм препарата, а также препарата ТраумельС.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Беречь от влажности!

Пенал закрывать сразу после применения препарата.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 18 лет.

## Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Cel_T