

Цель Т

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цель Т



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания гомеопатические** круглые, плоскоцилиндрические, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, возможно наличие желтых или серых вкраплений; запах практически отсутствует.

	1 таб.
Cartilago suis (картиляго суис) D4	300 мкг
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D4	300 мкг
Embryo totalis suis (Embryo suis) (эмбрио тоталис суис (эмбрио суис)) D4	300 мкг
Placenta totalis suis (Placenta suis) (плацента тоталис суис (плацента суис)) D4	300 мкг
Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (Токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D2	540 мкг
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D1	600 мкг
Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2	150 мкг
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D8	150 мкг
Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис (сангвинария)) D3	450 мкг
Sulfur (сульфур) D6	540 мкг
Nadidum (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) (надидум (никотинамид-аденин-динуклеотид)) D6	30 мкг
Coenzym A (коэнзим А) D6	30 мкг
Natrium diethylxalaceticum (Natriumdiethylxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D6	30 мкг
Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6	3 мг
Acidum DL- α -lipoicum (Acidum alpha-lipoicum) (ацидум DL- α -липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D6	30 мкг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

- артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз;
- плечелопаточный периартрит.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Спондилоартрит](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных;
- недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах - 5-10 недель; при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите - около 4 недель.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием, препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию с врачом, возможно включение в схему лечения других лекарственных форм препарата, а также препарата ТраумельС.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Цель Т

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Беречь от влажности!

Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cel_T