

Цель Т (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цель Т (мазь)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения гомеопатическая** от белого до желтовато-белого цвета, со слабым запахом.

	100 г
Cartilago suis (картиляго суис) D2	1 мг
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D2	1 мг
Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D2	1 мг
Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D2	1 мг
Rhus toxicodendron (Toxicodendron quercifolium) (рус токсикодендрон (токсикодендрон кверцифолиум)) D2	270 мг
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D2	300 мг
Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2	75 мг
Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D8	750 мг
Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис (сангвинария)) D2	225 мг
Sulfur (сульфур) D6	270 мг
Nadidum (надидум) D6	10 мг
Coenzym A (коэнзим A) D6	10 мг
Acidum DL- α -lipoicum (Acidum alpha-lipoicum) (ацидум DL- α -липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D6	10 мг
Natrium diethyloxalaceticum (Natrium diethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриум диэтилоксалацетат)) D6	10 мг
Acidum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6	1 г

Вспомогательные вещества: основа гидрофильная (эмульгирующий цетилстеариловый спирт, парафин жидкий, вазелин белый, вода очищенная, этанол 96 об.%), стабилизированная этанолом 12.8 об.%.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

- артрозы, в т.ч. гонартрозы, спондилоартроз;
- плечелопаточный периартрит.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Спондилоартрит](#)

Противопоказания:

- заболевания кожи, нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази;
- возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в т.ч. к токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет наносят 4-5 см мази на кожу в области болезненных суставов и втирают легкими движениями 2-3 раза/сут. Возможно наложение марлевой повязки.

Курс лечения при *артрозах* — 5-10 недель, при *спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите* — около 4 недель.

Побочное действие:

Возможны реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств.

Цель Т (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Особые указания и меры предосторожности:

Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других лекарственных форм препарата (раствора для внутримышечного введения Цель Т, таблеток для рассасывания Цель Т), а также препарата Траумель С.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Не применять по истечении срока годности. Беречь от перегрева!

Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cel_T_maz