# Целедерм С Гентамицином



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гентамицин - антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, действует бактерицидно. Эффективен в отношении микроорганизмов: Streptococcus (бета-гемолитических и альфа-гемолитических), Staphylococcus aureus (коагулазоположительных, коагулазоотрицательных, а также некоторых штаммов, продуцирующих пенициллиназу), Proteus vulgaris, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes.

Неактивен в отношении анаэробов, грибов и вирусов.

Бетаметазон - ГКС, оказывает местное противовоспалительное, сосудосуживающее, противоаллергическое действие. Тормозит высвобождение цитокинов и медиаторов воспаления, уменьшает метаболизм арахидоновой кислоты, индуцирует образование липокортина.

## Показания к применению:

— дерматиты простой и аллергический (особенно осложненные вторичным инфицированием);

— экзема;

— атопический дерматит;

— диффузный нейродермит;

— простой хронический лишай (ограниченный нейродермит);

— аногенитальный зуд;

— старческий зуд;

— себорейный дерматит;

— опрелость;

— солнечный дерматит;

— эксфолиативный дерматит;

— псориаз;

— эритродермия;

— красный плоский лишай;

— дисгидроз.

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Дерматит
- Зуд
- Лишай
- Нейродермит
- Псориаз
- Себорея
- Экзема

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— туберкулез кожи;

— кожные проявления сифилиса;

— ветряная оспа;

— простой герпес;

— вакциния (дерматоз, возникающий как осложнение противооспенной вакцинации);

— кожные поствакцинальные реакции;

— период лактации.

С *осторожностью*: беременность (I триместр).

## Способ применения и дозы:

На пораженные участки кожи наносят крем или мазь 2 раза/сут, в легких случаях возможно однократное применение. Мазь применяют при поражениях кожи на фоне экземы или псориаза, а крем - при заболеваниях влажной или жирной кожи.

## Побочное действие:

Жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, стероидные угри, гипопигментация.

При применении окклюзионных повязок - мацерация кожи, инфицирование, атрофия кожи, стрии, потница.

При продолжительном лечении или нанесении на большую поверхность - развитие системных побочных эффектов ГКС: повышение массы тела, остеопороз, повышение АД, отеки, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, обострение скрытых очагов инфекции, гипергликемия, возбуждение, бессонница, нарушения менструального цикла.

У детей - угнетение системы гипофиз-гипоталамус-надпочечники, синдром Кушинга, задержка роста, отставание в прибавке массы тела, повышение внутричерепного давления (бетаметазон).

Возможно преходящее раздражение кожи: зуд, эритематозные высыпания (гентамицин).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в период лактации. С *осторожностью*: беременность (I триместр).

## Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо избегать попадания в глаза.

При появлении признаков сенсибилизации или раздражения лечение следует прекратить.

В случае развития суперинфекции препарат отменяют и назначают адекватную антибактериальную терапию.

Следует иметь в виду, что системная абсорбция увеличивается при нанесении на значительные участки кожи, использовании больших доз и в течение длительного времени, а таккже при нанесении под окклюзионные повязки.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Celederm_S_Gentamicinom