Церебролизат



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения	**1 мл**
гидролизат головного мозга крупного рогатого скота, содержащий свободные аминокислоты и пептиды, в т.ч.:	
L-лизин	1.9±0.95 мг
L-гистидин	0.6±0.3 мг
L-аргинин	1.7±0.9 мг
аспарагиновая кислота	1.8±0.8 мг
L-треонин	1.4±0.7 мг
серин	2.3±0.95 мг
L-глутаминовая кислота	5±1.25 мг
L-аланин	3.5±1.75 мг
L-пролин	1.2±0.5 мг
глицин	1.4±0.7 мг
L-валин	2.7±1.35 мг
L-метионин	1.3±0.65 мг
L-лейцин	4±2 мг
L-фенилаланин	1±0.5 мг
изолейцин	2.2±1.4 мг
тирозин	0.4±0.25 мг

1 мл - ампулы темного стекла (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
1 мл - ампулы темного стекла (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Усиливает синтез протеинов в нервных клетках, повышает устойчивость ткани головного мозга к интоксикации, гипоксии, гипогликемии. Активизирует интегративные процессы в центральной нервной системе, улучшает концентрацию внимания, процессы запоминания.

Фармакокинетика

Фармакокинетический анализ затруднителен вследствие сложного состава, включающего свободные аминокислоты и пептиды.

Показания к применению:

— нарушения корковых функций головного мозга, вызванные недостаточностью мозгового кровообращения;

— дисциркуляторная энцефалопатия (различного генеза);

— состояние после черепно-мозговой травмы (в том числе с астеническим синдромом).

Относится к болезням:

- Астения
- Дисциркуляторная энцефалопатия
- Травмы
- Черепно-мозговая травма
- Энцефалит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С осторожностью: острая почечная недостаточность, аллергические диатезы, генерализованные судорожные припадки, беременность (I триместр).

Способ применения и дозы:

Внутримышечно по 1-5 мл ежедневно или через день, курс лечения - 20-30 дней. После 3-6 месячного перерыва курс лечения можно повторить.

Побочное действие:

Инъекции препарата болезненны, в отдельных случаях возможно раздражение тканей в месте инъекции.

При гипертонической болезни II-III ст. в период лечения церебролизатом может возникать повышение артериального давления.

Передозировка:

Нет сведений.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение в период беременности и лактации под контролем врача.

С осторожностью: I триместр беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

С осторожностью: острая почечная недостаточность.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cerebrolizat