

Церебрум Композитум Н



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инъекций гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Cerebrum suis (церебрум суис) D8	22 мкл
Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10	22 мкл
Hepar suis (гепар суис) D10	22 мкл
Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D10	22 мкл
Kalium phosphoricum (калиум фосфорикум) D6	22 мкл
Selenium (селениум) D10	22 мкл
Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) D6	22 мкл
Strychnos ignatii (Ignatia) (стригнос игнатии (игнатия)) D8	22 мкл
Bothrops lanceolatus (ботропс ланцеолятус) D10	22 мкл
Acidum phosphoricum (ацидум фосфорикум) D10	22 мкл
Cinchona pubescens (China) (цинхона пубесценс (хина)) D4	22 мкл
Sulfur (сульфур) D10	22 мкл
Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D8	22 мкл
Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (гельсемиум семпервиренс (гельсемиум)) D4	22 мкл
Ruta graveolens (Ruta) (рута гравеоленс (рута)) D4	22 мкл
Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D28	22 мкл
Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппокастанум (эскулюс)) D4	22 мкл
Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8	22 мкл
Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10	22 мкл
Semecarpus anacardium (Anacardium) (семекарпус анакардиум (анакардиум)) D6	22 мкл
Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D4	22 мкл
Medorrhinum-Nosode (медорринум-Нозоде) D13	22 мкл
Hyoscyamus niger (Hyoscyamus) (хиосциамус нигер (хиосциамус)) D6	22 мкл

Церебрум Композитум Н

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D6	22 мкл
Anamirta cocculus (Cocculus) (анамирта коккулюс (коккулюс)) D4	22 мкл
Ambra grisea (Ambra) (амбра гризея (амбра)) D10	22 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии) - около 9 мг/мл, вода д/и - до 2.2 мл.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

- энцефалопатия различного генеза (расстройство памяти, внимания);
- стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

Относится к болезням:

- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- известная повышенная чувствительность к хинину;
- детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают в/м, п/к, внутривенно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения - 4-6 недель. Возможны повторные курсы лечения после согласования с лечащим врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в т.ч. кожные аллергические реакции. При известной индивидуальной чувствительности к растениям семейства сложноцветных могут возникать реакции повышенной чувствительности (в т.ч. анафилактическая реакция).

Возможно временное появление красноты, припухлости и боли в месте инъекции.

В очень редких случаях, после приема препаратов, содержащих хинин, могут наблюдаться кожные аллергические реакции или лихорадочные состояния (реакции гиперчувствительности).

При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям в возрасте до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cerebrum_Kompozitum_N