

Цернилтон



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** круглые, двояковыпуклые, от бледно-желтого до светло-желтого цвета, с мелкими вкраплениями более темного оттенка, с гравировкой фирменного логотипа с одной стороны, со специфическим запахом.

	1 таб.
Graminex G60 (водорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений)	60 мг
Graminex GFX (жирорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений)	3 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 237.8 мг, кремния диоксид коллоидный - 5.6 мг, магния стеарат - 3.6 мг.

100 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.
200 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
200 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лекарственный препарат, применяемый при заболеваниях предстательной железы. Цернилтон оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, способствует регуляции метаболических процессов. Одним из фармакологических свойств препарата Цернилтон является дозозависимое ингибирование ЦОГ и 5-липооксигеназы, что приводит к угнетению синтеза медиаторов воспаления цикла арахидоновой кислоты - простагландинов и лейкотриенов - и, как следствие, к уменьшению воспаления и отека ткани предстательной железы. Препарат способствует устранению болевого синдрома.

Цернилтон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цернилтон обладает миорелаксирующим действием, что приводит к расслаблению гладкомышечных элементов задней стенки уретры и улучшению мочеиспускания.

Цернилтон уменьшает объем предстательной железы за счет ингибирования 5 α -редуктазы, избирательно блокирует α_1 -адренорецепторы гладкомышечных элементов уретры, оказывает антиандрогенное действие. Способствует улучшению эректильной функции.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- острого простатита;
- хронического простатита;
- доброкачественной гиперплазии предстательной железы;
- доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с простатитом.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

При *остром простатите* назначают по 4 таб. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения составляет 3 мес.

При *хроническом простатите* назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут. Продолжительность курса лечения - 3-6 мес.

При *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* назначают по 2 таб. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения составляет 12 недель, но может быть увеличена до 6 мес.

Побочное действие:

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата *возможны* аллергические реакции.

Редко: тошнота.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки препарата Цернилтон не наблюдались.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Информация о взаимодействии препарата Цернилтон с другими лекарственными средствами отсутствует.

Особые указания и меры предосторожности:

При хроническом бактериальном простатите применение препарата возможно только в сочетании с антибактериальными препаратами (под контролем врача).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Cernilton>