Цернилтон Форте



Код АТХ:

- G04CX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** твердые, размер №00, прозрачные, темно-зеленого цвета; содержимое капсул - порошок светло-желтого цвета.

	1 капс.
Graminex G60 (водорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений)	120 мг
Graminex GFX (жирорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений)	6 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 266 мг, кремния диоксид коллоидный - 7.6 мг, мальтодекстрин 10DE - 176.2 мг, кальция стеарат - 16 мг, кальция дигидрофосфат - 3.2 мг.

Состав оболочки капсулы: хлорофиллин-медь натрия - 0.83 мг, гипромеллоза - 117.17 мг.

50 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, применяемый при заболеваниях предстательной железы. Цернилтон форте оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, способствует регуляции метаболических процессов.

Одним из фармакологических свойств препарата Цернилтон форте является дозозависимое ингибирование ЦОГ и 5-липооксигеназы, что приводит к угнетению синтеза медиаторов воспаления цикла арахидоновой кислоты - простагландинов и лейкотриенов - и, как следствие, к уменьшению воспаления и отека ткани предстательной железы. Препарат способствует устранению болевого синдрома.

Цернилтон форте обладает миорелаксирующим действием, что приводит к расслаблению гладкомышечных элементов задней стенки уретры и улучшению мочеиспускания.

Препарат уменьшает объем предстательной железы за счет ингибирования 5α-редуктазы, избирательно блокирует α_1-адренорецепторы гладкомышечных элементов уретры, оказывает антиандрогенное действие. Способствует улучшению эректильной функции.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— острого и хронического простатита;

— доброкачественной гиперплазии предстательной железы;

— доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с простатитом.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

При *остром простатите* назначают по 2 капс. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом и составляет, в среднем, 3 мес.

При *хроническом простатите* назначают по 1 капс. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально лечащим врачом и составляет, в среднем, 3-6 мес.

При *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* назначают по 1 капс. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально лечащим врачом и составляет, в среднем, от 6 до 12 недель, но может быть увеличена до 6 мес.

Побочное действие:

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки препарата Цернилтон форте не наблюдались.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сведения о взаимодействии препарата Цернилтон форте с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cernilton_Forte