

Чаги Настойка



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Настойка	1 л
березовый гриб (чага)	100 г

40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
90 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действие настойки чаги определяется эффектом входящих в его состав биологически активных веществ (гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микроэлементов, в т. ч. марганца и кобальта, пигментов и других соединений). Препарат регулирует метаболические процессы, способствует повышению общей резистентности организма, снижает потоотделение, нормализует функцию кишечника, устраняет диспептические явления, оказывает общетонизирующее действие.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- хронического гастрита;
- язвенной болезни желудка вне обострения;
- дискинезии желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии.
- в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние больных со злокачественными образованиями различной этиологии.

Относится к болезням:

- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации;
- детский и подростковый возраст (до 18 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь по 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 мин до еды с небольшим количеством воды. Курс лечения 3-5 месяцев. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, при длительном применении - диспептические явления, повышенная возбудимость вегетативной нервной системы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное назначение пенициллина и в/в введение декстрозы (глюкозы).

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении препаратами чаги показана молочно-растительная диета, ограничение в рационе питания жиров и мяса, исключение копченостей, острых приправ, консервов.

Применение в детском возрасте

Запрещен в детском и подростковом возрасте (до 18 лет).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте, при температуре от 12 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Chagi_Nastoyka