Чаги Настойка



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Настойка***	**1 л**
березовый гриб (чага)	100 г

40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
90 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действие настойки чаги определяется эффектом входящих в его состав биологически активных веществ (гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микроэлементов, в т. ч. марганца и кобальта, пигментов и других соединений). Препарат регулирует метаболические процессы, способствует повышению общей резистентности организма, снижает потоотделение, нормализует функцию кишечника, устраняет диспептические явления, оказывает общетонизирующее действие.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— хронического гастрита;

— язвенной болезни желудка вне обострения;

— дискинезии желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии.

— в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние больных со злокачественными образованиями различной этиологии.

Относится к болезням:

- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— беременность;

— период лактации;

— детский и подростковый возраст (до 18 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь по 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 мин до еды с небольшим количеством воды. Курс лечения 3-5 месяцев. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, при длительном применении - диспептические явления, повышенная возбудимость вегетативной нервной системы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное назначение пенициллина и в/в введение декстрозы (глюкозы).

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении препаратами чаги показана молочно-растительная диета, ограничение в рационе питания жиров и мяса, исключение копченостей, острых приправ, консервов.

Применение в детском возрасте

Запрещен в детском и подростковом возрасте (до 18 лет).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте, при температуре от 12 до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Chagi_Nastoyka