

[Чемеричная вода](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Чемерицы Лобеля корневищ с корнями настойка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор для наружного применения** в виде мутной жидкости коричневатого-желтого цвета или жидкости коричневатого-желтого цвета с осадком, при взбалтывании переходящей в мутную.

	100 мл
Настойка чемерицы	50 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная 50 мл/100 мл.

40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопаразитарное (противопедикулезное) средство. Оказывает нейротоксическое действие на половозрелые особи насекомых.

Показания к применению:

Педикулез волосистой части головы.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2.5 лет.

Способ применения и дозы:

Чемеричная вода

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Наружно. Перед употреблением взбалтывать. Процедуру проводить в резиновых перчатках. Обильно нанести препарат на влажные волосы и кожу волосистой части головы, особое внимание обратить на обработку затылочной области и за ушами. Голову повязать косынкой. Не смывать препарат в течение 20-30 мин. Затем волосы тщательно промыть теплой проточной водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесать частым гребнем (расческой) для удаления погибших насекомых. Процедуру необходимо повторить через 7-10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы; ощущение жжения, покалывания или пощипывания в месте нанесения препарата.

Передозировка:

При случайном приеме препарата внутрь возможно отравление, которое проявляется в виде головокружения, тошноты, рвоты. В течение двух часов необходимо промыть желудок и провести симптоматическое лечение.

При случайном приеме внутрь более 100 мл препарата возможен летальный исход.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность, период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо избегать попадания препарата на слизистые оболочки глаз, полости носа, ротовой полости. В случае попадания тщательно промыть проточной водой.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 2.5 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Chemerichnaya_voda