Чистотела трава



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Чистотела большого трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ, в первую очередь алкалоиды, обеспечивает широкий спектр фармакологической активности травы чистотела. К основным видам действия следует отнести противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное и некоторое анальгезирующее действие. Свежий сок чистотела обладает вирусостатическим эффектом. Спазмолитическая активность травы чистотела обусловлена действием основного алкалоида хелидонина, кроме того, хелидонин обладает морфиноподобными свойствами. Гомохелидонин, напротив, оказывает возбуждающее действие на ЦНС, может вызывать судороги, обладает местноанестезирующей активностью. Алкалоид протопин уменьшает реактивность вегетативной нервной системы и, в отличие от хелидонина, повышает тонус гладкой мускулатуры. Сумма алкалоидов сангвинарина и хелеретрина (сангвиритрин) оказывает отчетливое антихолинэстеразное действие. Сангвиритрин действует бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также дрожжеподобные грибы и трихомонады.

Показания к применению:

Для наружного применения: плохо заживающие раны, туберкулез кожи, экземы, бородавки, мозоли, лишаи. Для приема внутрь: заболевания печени, желчного пузыря, подагра.

Относится к болезням:

- Бородавки
- Подагра
- Раны
- Туберкулез
- Экзема

Противопоказания:

Для приема внутрь: эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия.

Способ применения и дозы:

Приготовленный настой (5 г сырья на 200 мл воды) принимают внутрь по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза/сут. Наружно - в виде настоя или свежего сока.

Побочное действие:

При приеме внутрь: тошнота, рвота.

При наружном применении: местное раздражение кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме внутрь в случае передозировки возможен паралич дыхательного центра.

Не рекомендуется применять при беременности.

Можно применять в составе монотерапии и комбинированной терапии.

Источник: http://drugs.thead.ru/Chistotela_Trava