Ци-Клим Аланин



Код АТХ:

- G02CX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бета-аланин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
бета-аланин	400 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 69.33 мг, крахмал картофельный - 26.55 мг, мальтодекстрин - 19.47 мг, кремния диоксид коллоидный - 11 мг, тальк - 11 мг, кроскармеллоза натрия - 8.25 мг, кальция стеарат - 4.4 мг.

15 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
15 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоклимактерическое средство. Аминокислота β-аланин противодействует резкому высвобождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью, т.к. не вызывает блокаду гистаминовых H_1-рецепторов.

Оказывает прямое воздействие на расширение периферических кожных сосудов, которое лежит в основе вегетативных реакций при климаксе (приливы, ощущение тепла, жара, головную боль). Эти вазомоторные реакции

обусловлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе вследствие нарушений баланса церебральных нейротрансмиттеров, возникающих при прекращении секреции гормонов яичниками. Бета-аланин способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров.

Показания к применению:

"Приливы" в период менопаузы.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к бета-аланину.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь ежедневно. Суточная доза - 400-1200 мг. Длительность лечения - от 5-10 дней до исчезновения "приливов". При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.

Привыкание не возникает, курс лечения можно проводить на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

Побочное действие:

Редко: преходящие парестезии, как правило, в верхних и нижних конечностях.

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Бета-аланин предназначен для применения у женщин в период менопаузы.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ci-Klim_Alanin