

Цикадерма

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цикадерма



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения гомеопатическая** однородная, от желтого до желто-оранжевого цвета, с характерным запахом.

	100 г
вазелиновый экстракт из смеси трех видов свежих растений (<i>Calendula officinalis</i> (Календула лекарственная), <i>Hypericum perforatum</i> (Зверобой продырявленный), <i>Achillea millefolium</i> (Тысячелистник) в соотношении 20:10:10	97 г
<i>Ledum palustre</i> МТ (Багульник болотный, матричная настойка)	1.5 г
<i>Pulsatilla</i> МТ (Прострел, матричная настойка)	1.5 г

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами

Показания к применению:

- ожоги 1-2 степени;
- поверхностные раны (мелкие порезы, трещины, ссадины);
- укусы насекомых.

Относится к болезням:

- [Порезы](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- противопоказано нанесение на слизистые оболочки, открытые и инфицированные раны, при мокнущем дерматите;
- детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Наружно. **Детям от 1 года и взрослым** наносить мазь на предварительно обработанную рану 1-2 раза/сут, в случае необходимости наложить повязку. Длительность применения не должна превышать 7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо проконсультироваться с врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено никаких улучшений.

Не использовать для приема внутрь.

В период применения препарата следует избегать ультрафиолетового облучения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

Применение в детском возрасте

Препарат не применяется у детей до 1 года.

Цикадерма

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 25°C в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Cikaderma>