Цикадерма

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения гомеопатическая*** однородная, от желтого до желто-оранжевого цвета, с характерным запахом.

	100 г
вазелиновый экстракт из смеси трех видов свежих растений (Calendula officinalis (Календула лекарственная), Hypericum perforatum (Зверобой продырявленный), Achillea millefolium (Тысячелистник) в соотношении 20:10:10	97 г
Ledum palustre MT (Багульник болотный, матричная настойка)	1.5 г
Pulsatilla MT (Прострел, матричная настойка)	1.5 г

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентное гомеопатическое средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами

Показания к применению:

— ожоги 1-2 степени;

— поверхностные раны (мелкие порезы, трещины, ссадины);

— укусы насекомых.

Относится к болезням:

- Порезы
- Раны
- Ссадины

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;

— противопоказано нанесение на слизистые оболочки, открытые и инфицированные раны, при мокнущем дерматите;

— детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Наружно. **Детям от 1 года и взрослым** наносить мазь на предварительно обработанную рану 1-2 раза/сут, в случае необходимости наложить повязку. Длительность применения не должна превышать 7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо проконсультироваться с врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено никаких улучшений.

Не использовать для приема внутрь.

В период применения препарата следует избегать ультрафиолетового облучения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

Применение в детском возрасте

Препарат не применяется у детей до 1 года.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 25°C в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cikaderma