

Цикло 3



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Крем** светло-коричневого цвета с характерным запахом.

	1 г
сухой экстракт иглицы колючей	16 мг
жидкий экстракт травы донника лекарственного	20 мг

Вспомогательные вещества: макрогола стеарат (PEG 600, TEFOSE 1500), стеариновая кислота, парафин жидкий, сорбиновая кислота, метилпарагидроксibenзоат, вода очищенная.

40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Препарат обладает венотонирующим и ангиопротективным действием, вызывает увеличение эластичности вен, что позволяет улучшить отток крови и лимфы из больной конечности. Повышение тонуса вен связано с прямым стимулирующим влиянием на постсинаптические α -адренорецепторы гладкомышечных клеток сосудистой стенки. Препарат улучшает отток лимфы из периферических тканей. Цикло 3 крем снижает проницаемость и повышает резистентность капилляров, улучшает гемореологические свойства крови. Препарат не оказывает влияния на тонус артерий, не вызывает изменений АД. Лечебное действие препарата достигает максимума через 40 мин после нанесения крема на кожу и сохраняется в течение примерно 3 ч. Терапевтическое действие препарата усиливается при повышении температуры окружающей среды.

Фармакокинетика

После абсорбции препарата C_{max} гликозидов иглицы в роговом слое эпидермиса достигается через 30 мин, а в плазме крови — через 100 мин.

Показания к применению:

- хроническая венозная недостаточность;
- хроническая лимфатическая недостаточность.

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дерматоз.

Способ применения и дозы:

Препарат для наружного (накожного) применения у взрослых. Цикло 3 крем наносится путем легкого восходящего массажа в течение 2-3 мин 2 раз/сут. Продолжительность курса лечения устанавливает врач.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции (крапивница).

Передозировка:

Случаев передозировки не отмечалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно сочетанное применение с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Желательно не наносить крем на область трофических язв и пораженные дерматитом участки кожи.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ciklo_3