Цикло 3 форт



Код АТХ:

- C05C

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы желатиновые, размер №1, с желтым корпусом и оранжевой крышечкой; содержимое капсул - порошок желтоватого цвета.

	1 капс.
сухой экстракт иглицы колючей	150 мг
гесперидин метилхалкон	150 мг
аскорбиновая кислота	100 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль (макрогол 6000), кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки капсулы: желатин, хинолиновый желтый (Е104), желтый сансет "солнечный закат" (Е110), титана диоксид (Е171).

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Препарат повышает тонус вен, что связано с прямым стимулирующим влиянием на постсинаптические α-адренорецепторы гладкомышечных клеток сосудистой стенки, а также с влиянием на сосудистую стенку норадреналина, высвобождающегося из гранул запаса в пресинаптических нервных окончаниях. Кроме того, препарат обладает лимфотоническим действием, улучшает лимфатический отток из периферических тканей. Цикло 3 Форт снижает проницаемость и увеличивает резистентность капилляров.

Фармакокинетика

После абсорбции препарата C_{max} гликозидов иглицы и гесперидина (активного вещества цитрусовых) в плазме достигается через 2 ч. Лечебное действие препарата достигает максимума в конце 2-го ч после его приема и

сохраняется в течение 6 ч.

Показания к применению:

— функциональная и органическая хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (тяжесть в ногах, боли в мышцах, ночные судороги, отеки);

— геморрой;

— гинекологические заболевания: метроррагии, связанные с использованием контрацептивных средств, содержащих микродозы прогестерона, а также связанные с использованием внутриматочных средств; предменструальный синдром;

— хроническая лимфатическая недостаточность.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Геморрой
- Метроррагия
- Отеки
- Судороги

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. Капсулы проглатывют целиком, запивая водой.

Разовая доза — 1 капсула.

При *венозно-лимфатической недостаточности, при метроррагиях* средняя суточная доза препарата обычно составляет 2-3 капс.; при *геморрое* суточная доза составляет 4-5 капс.

Продолжительность курса лечения устанавливает врач (в среднем составляет, по меньшей мере, 2-4 недели).

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: возможны слабо выраженные диспептические явления, появление болей в животе, тошноты, диареи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности не рекомендуется за исключением случаев, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Не рекомендуется применять Цикло 3 Форт в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно сочетанное применение с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Соблюдение диеты не обязательно.

В случае возникновения тошноты или боли в желудке рекомендуется принимать препарат во время еды.

При появлении диареи следует прекратить лечение.

Лечение геморроидального криза препаратом должно быть кратковременным.

При неэффективности Цикло 3 Форт следует провести дополнительное обследование и скорректировать терапию.

Применение в детском возрасте

Противопоказан: возраст до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре до 25°С в сухом и в недоступном для детей месте.

По истечении срока годности, указанного на упаковке, не применять.

.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ciklo_3_fort