

Циклодинон



Код АТХ:

- [G02CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Прутняка обыкновенного плодов экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой зеленовато-голубого цвета, с матовой поверхностью, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного	3.2-4.8 мг,
что соответствует 40 мг лекарственного растительного сырья.	

Вспомогательные вещества: повидон, кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Состав оболочки: тальк, титана диоксид (IV) (E171), железа оксид желтый (E172), индигодин (E132), макрогол 6000, эметакриловой и этикриловой кислот сополимер.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Капли для приема внутрь в виде прозрачной, желто-коричневой жидкости, с запахом плодов прутняка обыкновенного; возможно выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

	100 г
сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного	192-288 мг,
что соответствует 2.4 г лекарственного растительного сырья.	

Вспомогательные вещества: повидон, сорбитол 70% (некристаллизующийся), полисорбат 20, натрия сахарат дигидрат, ароматизатор мяты перечной, этанол 96%, вода очищенная.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат, компоненты которого оказывают нормализующее действие на уровень половых гормонов. Оказывает допаминергическое действие, что вызывает снижение продукции пролактина, т.е. устраняет гиперпролактинемия. Повышенная концентрация пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, в результате чего могут возникать нарушения созревания фолликулов, овуляции и фазы желтого тела, что в дальнейшем ведет к дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном. Именно этот гормональный дисбаланс вызывает нарушения менструального цикла и мастодинию. Циклодинон нормализует соотношение гонадотропных гормонов, что приводит к нормализации второй фазы менструального цикла.

Пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и вызывая расширение молочных протоков. Снижение содержания пролактина приводит к обратному развитию патологических процессов в молочных железах и купирует болевой синдром.

Фармакокинетика

Действие экстракта плодов прутняка обыкновенного является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

- нарушения менструального цикла;
- мастодиния;
- предменструальный синдром.

Относится к болезням:

- [Мастит](#)
- [Нарушения менструального цикла](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 40 капель или по 1 таб. 1 раз/сут утром. Курс лечения - не менее 3 мес в непрерывном режиме. Если после отмены препарата жалобы появляются вновь, необходимо проконсультироваться с врачом и продолжить лечение.

Таблетки следует принимать не разжевывая. Флакон с каплями для приема внутрь перед употреблением следует взболтать, при использовании держать в вертикальном положении.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожные реакции.

Со стороны ЦНС: редко - психомоторное возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации.

Передозировка:

При соблюдении рекомендованного режима дозирования препарата случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности, а также в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с антагонистами допаминовых рецепторов возможно взаимное ослабление действия.

Взаимодействие препарата Циклодинон с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Капли для приема внутрь не следует применять после успешного лечения хронического алкоголизма.

Таблетки содержат молочный сахар (лактозу). Непереносимость лактозы может рассматриваться в качестве возможной причины болей в желудке и диареи, возникающей на фоне приема препарата.

Пациентка должна быть предупреждена о необходимости обратиться к врачу при развитии на фоне применения препарата слабости, депрессии, болей в молочных железах, нарушений менструального цикла.

Больные сахарным диабетом могут принимать капли для приема внутрь и таблетки, т.к. разовая доза Циклодинона содержит менее 0.03 ХЕ.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

При хранении капель для приема внутрь возможно выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ciklodinon>