

Циклорин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капсулы твердые желатиновые, размер №1, цвет капсулы: крышечка синего цвета и корпус желтого цвета. На крышечке напечатан логотип компании Люпин Лтд., на корпусе напечатана надпись "LUPIN". Содержимое капсулы - порошок от белого до светло-желтого цвета.

	1 капс.
Циклосерин	250 мг

Вспомогательные вещества: глицерил дибегенат - 25 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 70 мг, кальция карбонат - 5 мг.

Состав крышечки капсулы: краситель красный очаровательный (Е 129) - 0.102%, краситель бриллиантовый голубой (Е 133) - 0.75%, титана диоксид (Е 171) - 1.0725%, желатин - 83.5%, вода - 14.5%, натрия лаурилсульфат - 0.08%.

Состав корпуса капсулы: краситель красный очаровательный (Е 129) - 0.005%, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0.5%, титана диоксид (Е 171) - 1.0999%, желатин - 83.82%, вода - 14.5%, натрия лаурилсульфат - 0.08%.

6 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (10) - пачки картонные.

40 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противотуберкулезный антибиотик. Действует бактериостатически или бактерицидно в зависимости от концентрации в очаге инфекции и чувствительности микроорганизмов. Является аналогом аминокислоты D-аланина. Конкурентно угнетает активность ферментов L-аланин-рацемазы, превращающей L-аланин в D-аланин, и D-аланил-D-аланинсинтетазы, включающей D-аланин в пентапептид, необходимый для построения клеточной стенки бактерий.

Активен в отношении *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium avium*.

Показания к применению:

Туберкулез (в составе комбинированной терапии), атипичные микобактериальные инфекции (МАС-инфекции).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

Депрессия, психоз, алкоголизм, нарушение функции почек, эпилепсия, органические заболевания ЦНС, судорожные припадки в анамнезе, беременность, повышенная чувствительность к циклосерину.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь для взрослых доза составляет 0.25-1 г/сут в несколько приемов. *Максимальная доза* - 1 г/сут.

Для детей - 10-20 мг/кг/сут в разделенных дозах.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, чувство тревоги, спутанность сознания, депрессия, затрудненная речь, кошмарные сновидения, мышечные подергивания, тремор, двигательное беспокойство, периферическая невралгия, судорожные припадки.

Аллергические реакции: возможна кожная сыпь.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан к применению при беременности.

Циклосерин выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с этанолом увеличивается риск развития судорожных припадков; с этионамидом, изониазидом - увеличивается риск развития побочных реакций со стороны ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

При монотерапии циклосерином возможно быстрое развитие устойчивости микобактерий, поэтому следует применять только комбинированную терапию.

Необходимо тщательное наблюдение за пациентами, получающими циклосерин в дозе свыше 500 мг/сут, для выявления признаков токсического действия на ЦНС.

В период лечения не допускать употребления алкоголя.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ciklorin>