

Цимициклим



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капли для приема внутрь** от светло-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается появление осадка.

	100 г
Цимицифуги экстракт жидкий (1:5)* с содержанием суммы тритерпеновых агликонов в пересчете на амирин 0.27%	12 г

Вспомогательные вещества: натрия сахаринат - 0.05 г, масло листьев мяты перечной - 0.01 г, этанол 96% - 28.13 г, вода очищенная - 59.81 г.

* Цимицифуги экстракт жидкий (1:5) получают из корневищ с корнями цимицифуги даурской - *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim, или цимицифуги кистевидной - *Cimicifuga racemosa* L. Nutt.; экстрагент - спирт этиловый 50 %, соотношение сырье : конечный экстракт -1:5.

25 мл - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Циклоартановые тритерпеноиды, в т.ч. шенгманол, ацетилшенгманол, оказывают гипотензивное и седативное действие, повышают сократимость миокарда, не влияя на ЧСС. В сочетании с сапонинами и фитостерином они проявляют гиполлипидемическую, антиоксидантную и ангиопротекторную активность.

Оказывает эстрогеноподобное действие за счет связывания с эстрогеновыми рецепторами гипоталамических нейронов (воздействуя на систему гипоталамус-гипофиз-яичники). Это приводит к уменьшению выделения ГнРГ и последующему снижению секреции ЛГ передней долей гипофиза. Снижение выброса гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегетососудистых нарушений, возникающих в преклимактерический и климактерический периоды и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ.

Повышает диурез, увеличивает секрецию пищеварительных желез, расслабляет гладкие мышцы кишечника и мочевыводящих путей, оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

НЦД по гипертоническому типу, мягкая артериальная гипертензия, профилактика атеросклероза, климактерический невроз, мигрень, бессонница, токсикозы беременности, сопровождающиеся артериальной гипертензией.

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Бессонница](#)
- [Гипертензия](#)
- [Гипертония](#)
- [Мигрень](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к клопогону.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Аневризма аорты
- Аритмии
- Артериальная гипертензия
- Атриовентрикулярная блокада

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции, преходящие боли в области желудка.

Особые указания и меры предосторожности:

При гастритах с повышенной секрецией применять с осторожностью.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Cimiciklim>