

Цимициклим (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Цимициклим (таблетки)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклой формы.

	1 таб.
цимицифуги экстракт сухой	0.02 г
с содержанием суммы тритерпеновых агликонов в пересчете на амирин и сухое вещество	1.5%

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 0.09685 г, повидон (повидон К-17) - 0.0025 г, магния стеарат - 0.0012 г, тальк - 0.0007 г.

Вспомогательные вещества оболочки: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 0.00192 г, титана диоксид - 0.00131 г, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) - 0.00052 г.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Циклоартановые тритерпеноиды, в т.ч. шенгманол, ацетилшенгманол, оказывают гипотензивное и седативное действие, повышают сократимость миокарда, не влияя на ЧСС. В сочетании с сапонинами и фитостерином они проявляют гиполипидемическую, антиоксидантную и ангиопротекторную активность.

Оказывает эстрогеноподобное действие за счет связывания с эстрогеновыми рецепторами гипоталамических нейронов (воздействуя на систему гипоталамус-гипофиз-яичники). Это приводит к уменьшению выделения ГнРГ и последующему снижению секреции ЛГ передней долей гипофиза. Снижение выброса гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегетососудистых нарушений, возникающих в преклимактерический и климактерический периоды и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ.

Повышает диурез, увеличивает секрецию пищеварительных желез, расслабляет гладкие мышцы кишечника и мочевыводящих путей, оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению:

НЦД по гипертоническому типу, мягкая артериальная гипертензия, профилактика атеросклероза, климактерический невроз, мигрень, бессонница, токсикозы беременности, сопровождающиеся артериальной гипертензией.

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Бессонница](#)
- [Гипертензия](#)
- [Гипертония](#)
- [Мигрень](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Токсикоз](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к клопогону.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Аневризма аорты
- Аритмии
- Артериальная гипертензия
- Атриовентрикулярная блокада

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции, преходящие боли в области желудка.

Особые указания и меры предосторожности:

При гастритах с повышенной секрецией применять с осторожностью.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cimiciklim_tabletki