

## Цинктерал



### Код АТХ:

- [A12CB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цинка сульфат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** розово-фиолетового цвета, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
цинка сульфата гептагидрат (в пересчете на цинка сульфата моногидрат)	124 мг,
что соответствует содержанию цинка-иона	45 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон, тальк, магния стеарат, лактозы моногидрат.

*Состав оболочки:* гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), макрогол (полиоксиэтиленгликоль), титана диоксид, лак азорубиновый (E122).

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

150 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат цинка, участвующий в метаболизме и стабилизации клеточных мембран.

Входит в состав ферментов, участвует в различных биохимических реакциях.

Цинк является фактором, влияющим на процессы регенерации, передачу нервных импульсов. Усиливает действие инсулина, способствует синтезу кортизола.

## Показания к применению:

- в составе комплексного лечения заболеваний, ведущих к развитию дефицита цинка в организме;
- Acrodermatitis enteropathica (энтеропатический акродерматит);
- Alopecia areata (гнездное облысение) и Alopecia maligna (злокачественное облысение);
- Acne pustulosa и Acne phlegmonosa (пустулезные и гнойные угри);
- при длительном лечении кортикостероидами, особенно в момент отмены препаратов;
- в качестве вспомогательного лечения труднозаживающих ран.

## Относится к болезням:

- [Угри](#)
- [Энтерит](#)

## Противопоказания:

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*Предостережения:* при длительном применении препаратов цинка следует учесть риск возникновения недостатка меди; препарат не влияет на способность к вождению транспортных средств; избегать употребления спиртных напитков.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки нельзя делить или разжевывать.

*Энтеропатический акродерматит, гнездное облысение*

Взрослым и детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды.

По достижении клинического улучшения дозу снижают до 1 табл. 2 раза в сут, а затем 1 табл. в сут до полного исчезновения симптомов заболевания.

*Злокачественное облысение*

Взрослым – 1-2 табл. 3 раза в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут.

*Пустулезные и гнойные угри*

Взрослым – 1-2 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

*При состояниях, связанных с недостатком цинка*

Взрослым – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды, по мере исчезновения симптомов дозу можно снизить до 1 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

## Побочное действие:

Могут отмечаться (особенно при больших дозах) тошнота; диарея; изжога; лейкопения, сопровождающаяся повышением температуры, ознобом, болью в горле; сидеробластическая анемия, сопровождающаяся слабостью, снижением уровня меди в плазме крови. Редко встречаются головные боли, металлический привкус во рту.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* жгучая боль в полости рта и горле, водянистый или кровавый понос, отрыжка, рвота, артериальная гипотония, отек легких.

Могут также наблюдаться: гематурия, анурия, коллапс, судороги, гемолиз.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Соли цинка снижают всасывание тетрациклинов, меди (препарат следует применять не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

Тиазидные диуретики усиливают выведение цинка с мочой.

Фолиевая кислота может в небольшой степени нарушать всасывание цинка.

Высокие дозы железа, пеницилламин и другие комплексообразующие средства значительно уменьшают всасывание цинка (должны применяться не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

В отдельных случаях возможно применение препаратов цинка в сочетании с витаминно-минеральными комплексами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Назначается детям старше 4-х лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при комнатной температуре (15-20°C) в сухом, недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Cinkteral>