# Цинктерал



## Код АТХ:

- A12CB01

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цинка сульфат

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** розово-фиолетового цвета, круглые, двояковыпуклые.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| цинка сульфата гептагидрат (в пересчете на цинка сульфата моногидрат) | 124 мг, |
| что соответствует содержанию цинка-йона | 45 мг |

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон, тальк, магния стеарат, лактозы моногидрат.

*Состав оболочки:* гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), макрогол (полиоксиэтиленгликоль),титана диоксид, лак азорубиновый (Е122).

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
150 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат цинка, участвующий в метаболизме и стабилизации клеточных мембран.

Входит в состав ферментов, участвует в различных биохимических реакциях.

Цинк является фактором, влияющим на процессы регенерации, передачу нервных импульсов. Усиливает действие инсулина, способствует синтезу кортизола.

## Показания к применению:

— в составе комплексного лечения заболеваний, ведущих к развитию дефицита цинка в организме;

— Acrodermatitis enteropathica (энтеропатический акродерматит);

— Alopecia areata (гнездное облысение) и Alopecia maligna(злокачественное облысение);

— Acne pustulosa и Acne phlegmonosa (пустулезные и гнойные угри);

— при длительном лечении кортикостероидами, особенно в момент отмены препаратов;

— в качестве вспомогательного лечения труднозаживающих ран.

## Относится к болезням:

- Угри
- Энтерит

## Противопоказания:

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*Предостережения:* при длительном применении препаратов цинка следует учесть риск возникновения недостатка меди; препарат не влияет на способность к вождению транспортных средств; избегать употребления спиртных напитков.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки нельзя делить или разжевывать.

*Энтеропатический акродерматит, гнездное облысение*

Взрослым и детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды.

По достижении клинического улучшения дозу снижают до 1 табл. 2 раза в сут, а затем 1 табл. в сут до полного исчезновения симптомов заболевания.

*Злокачественное облысение*

Взрослым – 1-2 табл. 3 раза в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут.

*Пустулезные и гнойные угри*

Взрослым – 1-2 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

*При состояниях, связанных с недостатком цинка*

Взрослым – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды, по мере исчезновения симптомов дозу можно снизить до 1 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

## Побочное действие:

Могут отмечаться (особенно при больших дозах) тошнота; диарея; изжога; лейкопения, сопровождающаяся повышением температуры, ознобом, болью в горле; сидеробластическая анемия, сопровождающаяся слабостью, снижением уровня меди в плазме крови. Редко встречаются головные боли, металлический привкус во рту.

## Передозировка:

*Симптомы:* жгучая боль в полости рта и горле, водянистый или кровавый понос, отрыжка, рвота, артериальная гипотония, отек легких.

Могут также наблюдаться: гематурия, анурия, коллапс, судороги, гемолиз.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Соли цинка снижают всасывание тетрациклинов, меди (препарат следует применять не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

Тиазидные диуретики усиливают выведение цинка с мочой.

Фолиевая кислота может в небольшой степени нарушать всасывание цинка.

Высокие дозы железа, пеницилламин и другие комплексообразующие средства значительно уменьшают всасывание цинка (должны применяться не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

В отдельных случаях возможно применение препаратов цинка в сочетании с витаминно-минеральными комплексами.

## Особые указания и меры предосторожности:

***Применение в детском возрасте***

Назначается детям старше 4-х лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить при комнатной температуре (15-20°С) в сухом, недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Cinkteral