

## [Цинктерал-Тева](#)



### **Код АТХ:**

- [A12CB01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Цинка сульфат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** розово-фиолетового цвета, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
цинка сульфата гептагидрат (в пересчете на цинка сульфата моногидрат)	124 мг,
что соответствует содержанию цинка-иона	45 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон, тальк, магния стеарат, лактозы моногидрат.

*Состав оболочки:* гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), макрогол (полиоксиэтиленгликоль), титана диоксид, лак азорубиновый (E122).

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

150 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

### **Показания к применению:**

- в составе комплексного лечения заболеваний, ведущих к развитию дефицита цинка в организме;
- Acrodermatitis enteropathica (энтеропатический акродерматит);
- Alopecia areata (гнездное облысение) и Alopecia maligna (злокачественное облысение);
- Acne pustulosa и Acne phlegmonosa (пустулезные и гнойные угри);

— при длительном лечении кортикостероидами, особенно в момент отмены препаратов;

— в качестве вспомогательного лечения труднозаживающих ран.

### Относится к болезням:

- [Угри](#)
- [Энтерит](#)

### Противопоказания:

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*Предостережения:* при длительном применении препаратов цинка следует учесть риск возникновения недостатка меди; препарат не влияет на способность к вождению транспортных средств; избегать употребления спиртных напитков.

### Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки нельзя делить или разжевывать.

*Энтеропатический акродерматит, гнездное облысение*

Взрослым и детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды.

По достижении клинического улучшения дозу снижают до 1 табл. 2 раза в сут, а затем 1 табл. в сут до полного исчезновения симптомов заболевания.

*Злокачественное облысение*

Взрослым – 1-2 табл. 3 раза в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. 3 раза в сут.

*Пустулезные и гнойные угри*

Взрослым – 1-2 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

*При состояниях, связанных с недостатком цинка*

Взрослым – 1 табл. 3 раза в сут во время или после еды, по мере исчезновения симптомов дозу можно снизить до 1 табл. в сут;

Детям старше 4 лет – 1 табл. в сут.

### Побочное действие:

Могут отмечаться (особенно при больших дозах) тошнота; диарея; изжога; лейкопения, сопровождающаяся повышением температуры, ознобом, болью в горле; сидеробластическая анемия, сопровождающаяся слабостью, снижением уровня меди в плазме крови. Редко встречаются головные боли, металлический привкус во рту.

### Передозировка:

*Симптомы:* жгучая боль в полости рта и горле, водянистый или кровавый понос, отрыжка, рвота, артериальная гипотония, отек легких.

Могут также наблюдаться: гематурия, анурия, коллапс, судороги, гемолиз.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

## **Цинктерал-Тева**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Соли цинка снижают всасывание тетрациклинов, меди (препарат следует применять не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

Тиазидные диуретики усиливают выведение цинка с мочой.

Фолиевая кислота может в небольшой степени нарушать всасывание цинка.

Высокие дозы железа, пеницилламин и другие комплексообразующие средства значительно уменьшают всасывание цинка (должны применяться не ранее 2 ч после приема этих препаратов).

В отдельных случаях возможно применение препаратов цинка в сочетании с витаминно-минеральными комплексами.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при комнатной температуре (15-20°C) в сухом, недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Cinkteral-Teva>