Циннабсин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** от белого до серовато-белого цвета, возможно с легким оттенком желто-оранжевого цвета, иногда слегка пятнистые, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.

	1 таб.
Cinnabaris D3	25 мг
Hydrastis D3	25 мг
Kalium bichromicum D3	25 мг
Echinacea D1	25 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при синуситах. Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, уменьшает повышенную секрецию в пазухах носа. Облегчает носовое дыхание. Способствует укреплению иммунитета.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Циннабсин не изучена.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (гайморит, фронтит и

др.).

Относится к болезням:

- Воспаление
- Фронтит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Способ применения и дозы:

При *остром заболевании* **детям от 3 до 6 лет** назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

При *хронических заболеваниях* **детям от 3 до 6 лет** назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут; **детям от 6 до 12 лет** - по 1 таб. 2 раза/сут; **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.

Курс лечения для *профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний* - до 2 мес.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции; в единичных случаях - кожные реакции, при развитии которых препарат следует отменить.

После применения препарата может наблюдаться повышенное слюноотделение (в этом случае следует уменьшить дозу или прекратить прием препарата).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Циннабсин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Циннабсин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Циннабсина возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен

прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Циннабсина допускается использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 3 дней препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.

Прием препарата Циннабсин может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cinnabsin