Цинокап



Код АТХ:

- D11AX12

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пиритион цинка

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 0.2%*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха или со слабым специфическим запахом.

	1 г
пиритион цинк	2 мг

Вспомогательные вещества: макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт, парафин жидкий (масло вазелиновое), пропиленгликоль, декспантенол (D-пантенол), натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата додекагидрат, вода очищенная.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Дерматопротекторный препарат. Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена при действии на Pityrosporum ovale и Pityrosporum orbiculare, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению:

— псориаз;

— атопический дерматит (экзема, нейродермит);

— себорейный дерматит;

— сухость кожи.

Относится к болезням:

- Атопический дерматоз
- Дерматит
- Нейродермит
- Себорея
- Экзема

Противопоказания:

— детский возраст до 1 года;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения у **взрослых и детей в возрасте 1 года и старше**.

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза/сут.

Длительность лечения при *псориазе* составляет 1-1.5 мес, повторные курсы проводятся при появлении признаков обострения; при *атопическом дерматите* - 3-4 недели; при *себорейном дерматите* - 2 недели.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Препарат обычно хорошо переносится.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по безопасности применения препарата Цинокап при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 4° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cinokap