

[Цинокап \(аэрозоль\)](#)



Код АТХ:

- [D11AX12](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пиритион цинка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль для наружного применения 0.2%** в виде маслянистой жидкости от белого до светло-желтого цвета со специфическим запахом.

	1 г
пиритион цинк	2 мг

Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, изопропилмиририлат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), декспантенол (D-пантенол), полисорбат 80 (твин 80), этанол (спирт этиловый ректификованный), тетрафторэтан (хладон 134а).

58 г - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) в комплекте с насадкой-распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Дерматопротекторный препарат. Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена при действии на Pityrosporum ovale и Pityrosporum orbiculare, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

Цинокап (аэрозоль)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению:

- псориаз;
- атопический дерматит (экзема, нейродермит);
- себорейный дерматит.

Относится к болезням:

- [Атопический дерматоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Нейродермит](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения у **взрослых и детей в возрасте 1 года и старше**.

Перед применением баллон встряхнуть. Распылять препарат на пораженный участок кожи с расстояния около 15 см в течение 3 сек, покрывая при этом поверхность, равную по площади ладони (что эквивалентно расходу 1 мл препарата). Пораженный участок обрабатывают 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для обработки препаратом волосистой части головы прилагается дополнительная насадка.

Применение препарата рекомендуется продолжить в течение 1 недели после исчезновения симптомов.

Длительность лечения при *псориазе* составляет 1-1.5 мес, повторные курсы проводятся при появлении признаков обострения; при *атопическом дерматите* - 3-4 недели; при *себорейном дерматите* - 2 недели.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Препарат обычно хорошо переносится.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по безопасности применения препарата Цинокап при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При распылении баллон следует держать вертикально.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4° до 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Cinokap_aerozol