Ципролон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 0.3% в виде прозрачной, бесцветной или слабо окрашенной жидкости.

	1 мл
ципрофлоксацина гидрохлорид	3.5 мг,
в т.ч. ципрофлоксацин	3 мг

10 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальный препарат из группы производных фторхинолонов. Механизм действия связан с ингибированием фермента ДНК-гиразы бактерий и нарушением синтеза ДНК. Препарат повышает проницаемость клеточной оболочки бактерий. Оказывает бактерицидное действие на бактерии, находящиеся как в фазе размножения, так и в фазе покоя.

Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp. (индол-положительные и индол-отрицательные штаммы), Morganella morganii, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Yersinia spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Hafnia alvei, Providencia stuarti, Haemophilus influenzae, Pasteurella multocida, Pseudomonas spp., Gardnerella spp., Legionella pneumophila, Neisseria spp., Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Brucella spp., Chlamydia spp , Aeromonas spp., Serratia marcescens, Edwardsiella tarda.

К препарату *чувствительны также грамположительные микроорганизмы:* Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocitogenes.

К препарату *резистентны* Ureaplasma urealyticum, Clostridium difficile, Nocardia asteroides.

Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глаз:

— конъюнктивит (в т.ч. гонококковый);

— блефарит;

— блефароконъюнктивит;

— кератит;

— кератоконъюнктивит;

— бактериальная язва роговицы;

— трахома.

Профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний глаз:

— после удаления инородного тела из роговицы, конъюнктивы;

— после повреждения химическими или физическими средствами;

— до и после хирургических вмешательств.

Относится к болезням:

- Блефарит
- Блефароконъюнктивит
- Близорукость (миопия)
- Инфекции
- Кератит
- Кератоконус
- Конъюнктивит
- Трахома
- Язва
- Язва роговицы

Противопоказания:

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание);

— детский и подростковый возраст до 15 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

При *инфекционных заболеваниях легкой и умеренной степени тяжести* средняя рекомендуемая доза составляет 1-2 капли в пораженный глаз (или в оба глаза) каждые 4 ч; при *тяжелых инфекциях* - по 1-2 капли каждый час.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, жжение, гиперемия конъюнктивы.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Ципролон отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Раствор препарата несовместим с растворами лекарственных средств, имеющих значения pH 3-4, которые физически или химически нестабильны.

Особые указания и меры предосторожности:

При одновременном использовании препарата Ципролон с другими глазными каплями интервал между закапываниями должен составлять не менее 5-10 мин.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При временно возникающих нарушениях зрения, связанных с инстилляцией глазных капель, пациентам следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности до исчезновения нежелательных явлений.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям и подросткам до 15 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ciprolon