

## [Ципротерон-Тева](#)



### Код АТХ:

- [G03HA01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ципротерон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** белого цвета, круглые, с риской на одной стороне и надписью "CYPROT 50" - на другой.

	<b>1 таб.</b>
Ципротерона ацетат	50 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, лактозы моногидрат, кросповидон, натрия лаурилсульфат, гидроксипропилцеллюлоза, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Противоопухолевые средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ципротерон ацетат является синтетическим антиандрогенным препаратом. Механизм действия основан на конкурентном связывании с андрогеновыми рецепторами в андроген-зависимых органах, что приводит к снижению их функциональной активности. В дополнение к антиандрогенному действию, ципротерон ацетат обладает также сильными антигонадотропными свойствами и гестагенной активностью.

#### Фармакокинетика

Препарат полностью всасывается после приема внутрь, подвергаясь биотрансформации в печени.  $C_{max}$  препарата достигается в среднем через 3 ч. Период полувыведения составляет  $43.9 \pm 12.8$  ч. Препарат выводится в основном в виде метаболитов с желчью и мочой, часть препарата выводится в неизменном виде. Соотношение препарата в моче и желчи составляет 3:7. Связывание с белками сыворотки крови составляет около 96 %.

## Показания к применению:

*У мужчин:*

- метастазирующий или неоперабельный рак предстательной железы (без и после орхиэктомии, а также в сочетании с агонистами лютеинизирующего гормона - рилизинг гормона);
- коррекция патологических отклонений в сфере полового поведения (при необходимости снижения сексуальной активности).

*У женщин:*

- выраженные явления андрогенизации, в том числе различные формы гирсутизма и акне;
- андрогенная алопеция.

## Относится к болезням:

- [Акне](#)
- [Гирсутизм](#)
- [Рак](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к ципротерону или к другим составным частям препарата;
- беременность и период кормления грудью;
- выраженные нарушения функции печени;
- синдром Дубина-Джонсона и синдром Ротора;
- опухоли печени, в том числе в анамнезе (за исключением метастатического поражения печени при раке предстательной железы);
- тяжелый сахарный диабет с сосудистыми осложнениями;
- кахексия (за исключением больных раком предстательной железы);
- серповидно-клеточная анемия;
- тромбозомболические процессы (в том числе в анамнезе);
- тяжелые хронические депрессивные состояния;
- идеопатическая желтуха, герпес или зуд во время предыдущих беременностей;
- подростковый возраст до завершения периода полового созревания.

## Способ применения и дозы:

Для лечения рака предстательной железы Ципротерон-Тева назначается в дозе 200-300 мг в сут разделенной на 2-3 приема, длительно до появления признаков прогрессирования заболевания.

Для снижения сексуальной активности: 100-200 мг в сут (по 1-2 таблетки два раза в день) обычно в течение нескольких недель до достижения терапевтического эффекта. Далее переходят на поддерживающие дозы - 50 мг (по половине таблетки 2 раза в день). При прекращении лечения препарат следует отменять постепенно (на 25 мг в неделю).

У женщин детородного возраста Ципротерон-Тева применяется в дозе 100 мг 1 раз в день, начиная с первого дня менструального цикла, в течение 10 дней с одновременным приемом пероральных контрацептивов. Следующий 10-дневный курс лечения начинают строго через 4 недели. При наступлении терапевтического эффекта доза препарата может быть снижена до 25-50 мг в день.

У женщин в постменопаузе Ципротерон-Тева применяется в дозе 25-50 мг в день на протяжении 21 дня с последующим недельным перерывом, пациенткам с удаленной маткой препарат можно назначать в тех же дозах без

перерыва.

Таблетки Ципротерон-Тева следует принимать после еды, запивая большим количеством воды (до 100 мл).

### **Побочное действие:**

В начале лечения могут наблюдаться боли в животе, тошнота, повышенная утомляемость, мышечная слабость, сухость кожи, общая апатия, депрессивные состояния или состояния беспокойства. Может увеличиваться или уменьшаться масса тела. В индивидуальных случаях при применении высоких доз наблюдались одышка и нарушения функции печени.

У мужчин возможно появление гинекомастии и подавление сперматогенеза, у женщин - болей, напряжения или увеличения молочных желез, снижения либидо, нарушения менструального цикла, у женщин в постменопаузе могут наблюдаться циклические кровотечения.

### **Передозировка:**

При передозировке, если больной в сознании и без спонтанной рвоты, следует вызвать рвоту. Необходимо применять симптоматическую терапию при постоянном наблюдении за больным и жизненно-важными функциями.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применять препарат при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении ципротерона с пероральными контрацептивами повышается риск развития тромбозов.

Алкоголь снижает действие ципротерона.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Лечение Ципротероном-Тева следует проводить под контролем функции печени, коры надпочечников и картины периферической крови, уровня глюкозы в крови.

При наличии признаков гепатотоксичности прием препарата следует отменить.

У лиц, страдающих алкоголизмом, применение ципротерона обычно неэффективно. Больные с органическими нарушениями головного мозга и психическими болезнями, страдающие сексуальными нарушениями, обычно резистентны к лечению Ципротероном-Тева.

Если у больного имеются нарушения фертильности, рекомендуется перед началом лечения осуществить анализ спермограммы.

Перед началом лечения женщинам необходимо провести эндокринологические тесты и получить консультацию гинеколога.

У больных, страдающих легкими формами сахарного диабета, мониторинг уровня сахара должен проводиться чаще, чем обычно (например, каждые 8 недель).

При эпилепсии, множественном склерозе, порфирии, отосклерозе, столбняке, артериальной гипертензии риск развития побочных реакций повышается.

При начале лечения Ципротероном-Тева беременность должна быть полностью исключена. Женщинам детородного возраста наряду с пероральными контрацептивами рекомендуется использовать барьерные противозачаточные средства. Если в процессе проведения лечения прекращаются менструации, препарат следует отменить до окончательного исключения беременности.

Негативного влияния Ципротерона-Тева на фертильность после прекращения лечения не отмечено.

В период лечения необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания.

## **Ципротерон-Тева**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени, синдроме Дубина-Джонсона, синдроме Ротора; при опухолях печени, в том числе в анамнезе (за исключением метастатического поражения печени при раке предстательной железы).

При наличии признаков гепатотоксичности прием препарата следует отменить.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в подростковом возрасте до завершения периода полового созревания.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при температуре 15-25°C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ciproteron-Teva>