# Цисплатин-Эбеве



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цисплатин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противоопухолевые средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Противоопухолевое средство, содержит платину. Механизм действия подобен действию алкилирующих препаратов и заключается в нарушении функции нитей ДНК и образовании сшивок между ними.

***Фармакокинетика***

Цисплатин плохо проникает через ГЭБ. Быстро метаболизируется путем неферментативного превращения в неактивные метаболиты. Связывание с белками (в виде метаболитов) составляет 90%.

$T_{1/2}$ в начальной фазе составляет 25-49 мин; в конечной фазе при нормальной выделительной функции почек - 58-73 ч, при анурии - до 240 ч. Выводится почками, 27-43% через 5 дней; платину можно обнаружить в тканях в течение 4 мес после введения.

## Показания к применению:

Герминогенная опухоль яичка или яичников, рак яичников, рак тела матки, саркома матки, рак шейки матки и фаллопиевых труб, рак яичников, рак почечной лоханки и мочеточников, рак мочевого пузыря и уретры, рак простаты и полового члена, остеогенная саркома, саркома Юинга, нейробластома, ретинобластома, саркома мягких тканей, лимфома, хорионкарцинома матки, медуллобластома, рак кожи, меланома, опухоль головы и шеи, рак пищевода, рак легкого, рак желудка, рак толстой кишки, злокачественная тимома, мезотелиома.

## Относится к болезням:

- Кома
- Лимфома
- Меланома

- Опухоли
- Простатит
- Рак
- Рак легких
- Рак шейки матки
- Рак яичников
- Уретрит

## Противопоказания:

Выраженные нарушения функции почек, нарушение слуха, полиневрит, угнетение гемопоэза, беременность, повышенная чувствительность к цисплатину.

## Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, состояния системы кроветворения, схемы противоопухолевой терапии.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, стоматит, анорексия.

*Со стороны системы кроветворения:* лейкопения, анемия, тромбоцитопения.

*Со стороны ЦНС:* судороги, периферическая невропатия, неврит зрительного нерва, нарушения цветовосприятия, ототоксичность.

*Со стороны обмена веществ:* гиперурикемия, гипокальциемия, гипомагниемия, синдром неадекватной секреции АДГ.

*Со стороны репродуктивной системы:* аменорея, азооспермия.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, артериальная гипотензия.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, ангионевротический отек, осиплость голоса.

*Прочие:* нефротоксическое действие.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Цисплатин противопоказан при беременности. При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Женщины детородного возраста должны применять надежные методы контрацепции во время терапии цисплатином.

В *экспериментальных исследованиях* установлено тератогенное и эмбриотоксическое действие цисплатина.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение цисплатина с урикозурическими противоподагрическими средствами может увеличивать риск возникновения нефропатии.

Сочетанное применение с антигистаминными средствами, фенотиазинами, тиоксантенами может маскировать симптомы ототоксического действия цисплатина.

При одновременном применении с препаратами, оказывающими ототоксическое, нефротоксическое, нейротоксическое действие, возможно усиление токсических эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуют применять цисплатин у пациентов с ветряной оспой (в т.ч. недавно перенесенной или после контакта с заболевшими), с опоясывающим герпесом и другими острыми инфекционными заболеваниями.

С осторожностью применяют у больных с подагрой или нефролитиазом (в т.ч. в анамнезе), а также у пациентов, ранее получавших цитотоксическую химиотерапию или лучевую терапию.

Перед началом и в период лечения цисплатином необходимо контролировать картину периферической крови, лабораторные данные функции почек и печени, показатели водно-электролитного обмена и уровень мочевой кислоты, проводить аудиометрию и неврологические осмотры.

Первые проявления нефротоксического действия цисплатина возникают на 2-й неделе после введения и проявляются повышением уровней креатинина, мочевой кислоты, остаточного азота и/или снижением КК. Для уменьшения нефротоксичности перед началом лечения рекомендуют провести в/в инфузию 0.9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы и дополнительно назначить маннитол.

На фоне терапии цисплатином не рекомендуют проводить вакцинацию пациентов и членов их семей.

В *экспериментальных исследованиях* установлено канцерогенное и мутагенное действие цисплатина.

***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Cisplatin-Ebeve