Цистон



Код АТХ:

- G04BC

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** светло-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
экстракт цветков двуплодника стебелькового	65 мг
экстракт стеблей камнеломки язычковой	49 мг
экстракт стеблей марены сердцелистной	16 мг
экстракт корневищ сыти пленчатой	16 мг
экстракт семян соломоцвета шероховатого	16 мг
экстракт надземной части оносмы прицветковой	16 мг
экстракт целого растения вернонии пепельной	16 мг
порошок мумие очищенного	13 мг
порошок извести силиката	16 мг,
обработанные над паром экстракта смеси растительного сырья: надземной части базилика душистого, семян конских бобов, плодов якорцев стелющихся, семян мимозы стыдливой, целого растения павонии ароматной, целого растения хвоща полевого, семян тикового дерева.	

Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия карбоксиметилцеллюлоза, кросповидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

100 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный растительный препарат. Оказывает диуретическое, спазмолитическое, литолитическое, противомикробное и противовоспалительное действие.

Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий, магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их деминерализации.

Препятствует аккумуляции частиц вокруг ядра камня, что предотвращает его дальнейший рост.

Стимулируя диурез и расслабляя гладкую мускулатуру мочевого тракта, Цистон способствует выведению оксалатных и фосфатных солей, мочевой кислоты и мелких камней из мочевыводящих путей.

Цистон оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно в отношении Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и других грамотрицательных бактерий.

Литолитический эффект препарата не зависит от pH мочи.

Фармакокинетика

Терапевтический эффект препарата Цистон обусловлен совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— мочекаменной болезни;

— кристаллурии;

— инфекций мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты);

— подагры.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей
- Мочекаменная болезнь
- Подагра
- Цистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В *комплексной терапии мочекаменной болезни* препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут в течение 4-6 мес или до выхода камней.

В *комплексной терапии инфекций мочевыводящих путей* препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут до ликвидации процесса.

Для *предотвращения рецидива после хирургического удаления или выхода камней* - по 2 таб. 2 раза/сут в течение 1 мес, затем по 1 таб. 2 раза/сут в течение 4-5 мес.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата Цистон отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не противопоказано применение у беременных при циститах.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Цистон не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что действие препарата Цистон развивается постепенно.

Не рекомендуется применять препарат при острых болях в области мочевыводящих путей.

В случае появления острых болей в процессе лечения следует прекратить прием препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ciston