Цитеал



Код АТХ:

- D08AC52

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения*** вязкий, светло-желтого цвета, с характерным запахом, при взбалтывании пенится.

	100 мл
гексамидина диизотионат	100 мг
раствор хлоргексидина биглюконата 20%	0.5 мл,
что соответствует содержанию хлоргексидина биглюконата	100 мг
хлорокрезол	300 мг

Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин (лауриламидобетаин 30%), диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, этилендиаминтетрауксусная кислота, ароматизатор "конифeрол", молочная кислота, вода очищенная.

250 мл - флаконы полиэтиленовые.
1 л - флаконы полиэтиленовые.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Антисептическое средство. Действие препарата обусловлено входящими в его состав веществами: гексамидин - катионовый антисептик из группы диамидинов; хлоргексидин - катионовый антисептик, синтетический бигуанид; хлорокрезол - антисептик из группы галогенофенолов. Обладает бактериостатическим действием в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, грибов, простейших; бактерицидным - в отношении

Pseudomonas aeruginosa. При аппликации на неповрежденную кожу не всасывается. Терапевтический эффект сохраняется до 18 ч после однократной аппликации.

Показания к применению:

— обработка кожи и слизистых (микозы, экзема, акне, язвы, опрелость, дерматит с сопутствующими бактериальными инфекциями, вульвит, вагинит, цервицит и др.);

— обработка рук медперсонала;

— профилактика инфекций, передаваемых половым путем.

Относится к болезням:

- Акне
- Вагинит
- Вульвит
- Инфекции
- Микоз
- Цервицит
- Экзема

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гинекология	
Показания	**Способ применения**
Вульвиты	Неразведенный раствор
Микробные или грибковые вагиниты лечение профилактика	В разведении 1:10 ежедневные спринцевания (плюс специфическое лечение) спринцевания 2 раза в неделю
Цервициты	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Рецидивирующие инфекционные заболевания половых органов	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор
Дерматология	
Показания	**Способ применения**
Микозы отрубевидный лишай грибковая опрелость дерматофития стоп	Неразведенный раствор для лечения: ежедневно для профилактики: 2 раза в неделю
Бактериальная экзема	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Акне	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Опрелость у детей	В разведении 1:10
Язвы нижних конечностей	В разведении 1:10
Первичные бактериальные дерматозы (фурункулез, импетиго, карбункулез, фолликулиты)	В разведении 1:10
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор
Хирургия	
Показания	**Способ применения**
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор

Растворы следует готовить непосредственно перед применением.

Аппликацию препарата осуществляют ежедневно, средний курс лечения составляет 10-15 дней; для профилактики — 2 раза в неделю в течение 3-6 месяцев.

После применения препарата необходимо обильное промывание водой места аппликации.

Побочное действие:

Чувство покалывания, зуд, жжение, сухость кожи, покраснение (при длительном применении). Контактная экзема, контактный дерматит, особенно при нанесении на поврежденную или изъязвленную кожу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с другими антисептиками (взаимная инактивация).

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленные растворы препарата хранению не подлежат.

Не рекомендуется использовать препарат в офтальмологической практике, а также для обработки наружного слухового прохода при подозрении на перфорацию барабанной перепонки. Препарат следует применять с осторожностью при повторных аппликациях, особенно на большие по площади поверхности кожи, под окклюзионные повязки, на поврежденную кожу (в частности, обожженную), у детей и на слизистые оболочки.

Препарат не используют для антисептической обработки кожи перед проведением медицинских манипуляций: пункция, забор крови.

Препарат не используют для дезинфекции хирургического материала.

Препарат не используют вместе с твердыми и жидкими мылами.

После вскрытия флакона существует риск микробного загрязнения препарата.

В случае случайного проглатывания не проводить промывание желудка (пенистый раствор).

Применение в детском возрасте

Препарат следует применять с осторожностью у детей.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С в защищенном от света и в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Citeal