Цитеал



Код АТХ:

• D08AC52

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Форма выпуска:

◊ Раствор для наружного применения вязкий, светло-желтого цвета, с характерным запахом, при взбалтывании пенится.

	100 мл
гексамидина диизотионат	100 мг
раствор хлоргексидина биглюконата 20%	0.5 мл,
что соответствует содержанию хлоргексидина	100 мг
биглюконата	
хлорокрезол	300 мг

Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин (лауриламидобетаин 30%), диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, этилендиаминтетрауксусная кислота, ароматизатор "кониферол", молочная кислота, вода очищенная.

250 мл - флаконы полиэтиленовые.

1 л - флаконы полиэтиленовые.

Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Антисептическое средство. Действие препарата обусловлено входящими в его состав веществами: гексамидин - катионовый антисептик из группы диамидинов; хлоргексидин - катионовый антисептик, синтетический бигуанид; хлорокрезол - антисептик из группы галогенофенолов. Обладает бактериостатическим действием в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, грибов, простейших; бактерицидным - в отношении

Pseudomonas aeruginosa. При аппликации на неповрежденную кожу не всасывается. Терапевтический эффект сохраняется до 18 ч после однократной аппликации.

Показания к применению:

- обработка кожи и слизистых (микозы, экзема, акне, язвы, опрелость, дерматит с сопутствующими бактериальными инфекциями, вульвит, вагинит, цервицит и др.);
- обработка рук медперсонала;
- профилактика инфекций, передаваемых половым путем.

Относится к болезням:

- <u>Акне</u>
- Вагинит
- Вульвит
- Инфекции
- Микоз
- Цервицит
- Экзема

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Гинекология	
Показания	Способ применения
Вульвиты	Неразведенный раствор
Микробные или грибковые вагиниты	В разведении 1:10
лечение	ежедневные спринцевания (плюс специфическое лечение)
	спринцевания 2 раза в неделю
профилактика	
Цервициты	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Рецидивирующие инфекционные заболевания половых	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
органов	
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор
Дерматология	
Показания	Способ применения
Микозы	Неразведенный раствор
отрубевидный лишай	для лечения: ежедневно
грибковая опрелость	для профилактики: 2 раза в неделю
дерматофития стоп	
Бактериальная экзема	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Акне	Неразведенный раствор или в разведении 1:10
Опрелость у детей	В разведении 1:10
Язвы нижних конечностей	В разведении 1:10
Первичные бактериальные дерматозы (фурункулез,	В разведении 1:10
импетиго, карбункулез, фолликулиты)	
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор
Хирургия	
Показания	Способ применения
Антисептическая обработка рук медперсонала	Неразведенный раствор

Растворы следует готовить непосредственно перед применением.

Аппликацию препарата осуществляют ежедневно, средний курс лечения составляет 10-15 дней; для профилактики — 2 раза в неделю в течение 3-6 месяцев.

После применения препарата необходимо обильное промывание водой места аппликации.

Побочное действие:

Чувство покалывания, зуд, жжение, сухость кожи, покраснение (при длительном применении). Контактная экзема, контактный дерматит, особенно при нанесении на поврежденную или изъязвленную кожу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с другими антисептиками (взаимная инактивация).

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленные растворы препарата хранению не подлежат.

Не рекомендуется использовать препарат в офтальмологической практике, а также для обработки наружного слухового прохода при подозрении на перфорацию барабанной перепонки. Препарат следует применять с осторожностью при повторных аппликациях, особенно на большие по площади поверхности кожи, под окклюзионные повязки, на поврежденную кожу (в частности, обожженную), у детей и на слизистые оболочки.

Препарат не используют для антисептической обработки кожи перед проведением медицинских манипуляций: пункция, забор крови.

Препарат не используют для дезинфекции хирургического материала.

Препарат не используют вместе с твердыми и жидкими мылами.

После вскрытия флакона существует риск микробного загрязнения препарата.

В случае случайного проглатывания не проводить промывание желудка (пенистый раствор).

Применение в детском возрасте

Препарат следует применять с осторожностью у детей.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C в защищенном от света и в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Цитеал

• Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Источник: http://drugs.thead.ru/Citeal