

## Д-Пантенол



### Код АТХ:

- [D03AX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения 5%** гомогенный, белого цвета, со специфическим запахом.

	<b>1 г</b>
декспантенол	50 мг

*Вспомогательные вещества:* кетوماкрогол - 40 мг, цетеарил октаноат - 50 мг, цетанол - 40 мг, диметикон - 5 мг, глицерил моностеарат - 40 мг, пропиленгликоль - 50 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.7 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.3 мг, вода очищенная - 723.8 мг, ароматизатор Seaside 2026 - 0.2 мг.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◇ **Мазь для наружного применения 5%** однородная, светло-желтого цвета, с характерным запахом ланолина.

	<b>1 г</b>
декспантенол	50 мг

*Вспомогательные вещества:* фенолип - 4 мг, ланолин - 160 мг, воск пчелиный белый - 50 мг, парафин белый мягкий - 210.8 мг, диметикон - 5 мг, эмульгатор LANETTE SX - 20 мг, пропиленгликоль - 20 мг, бутилгидроксианизол - 0.1 мг, бутилгидрокситолуен - 0.1 мг, декаметилциклопентасилоксан - 20 мг, магния сульфат гептагидрат - 5 мг, протегин В - 295 мг, вода очищенная - 160 мг.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат, улучшающий регенерацию тканей, для наружного применения.

Декспантенол - производное пантотеновой кислоты, которая является водорастворимым витамином группы В, необходимым в качестве составной части кофермента А для углеводного, белкового и жирового обмена. Играет важную роль в процессах ацетилирования при глюконеогенезе, высвобождении энергии из углеводов, синтезе и расщеплении жирных кислот, синтезе стероидов и стероидных гормонов, ацетилхолина.

Пантотеновая кислота необходима для поддержания нормальной функции эпителия, повышение потребности в ней отмечается при повреждении кожных покровов или тканей, в этом случае локальный дефицит пантотеновой кислоты можно восполнить местным применением мази Д-Пантенол.

Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Оказывает регенерирующее, слабое противовоспалительное действие, питает и смягчает кожу.

Вспомогательные вещества улучшают терапевтические свойства мази.

### Фармакокинетика

Низкая молекулярная масса декспантенола, гидрофильность и низкая полярность делают возможным проникновение активных веществ во все слои кожи.

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом, с бета-глобулином и альбумином).

## Показания к применению:

— у детей - пеленочный дерматит, царапины, незначительные раздражения после воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского излучения, для лечения и профилактики опрелостей;

— трещины и воспаления сосков у кормящих матерей;

— нарушения целостности кожных покровов, вызванные механическими, химическими, температурными факторами или после хирургического вмешательства (ожоги различного происхождения /в т.ч. солнечные/, царапины, ссадины, раны, пролежни, плохо заживающие кожные трансплантаты, асептические послеоперационные раны);

— воспалительные процессы на коже, дерматиты, фурункулы, трофические язвы нижних конечностей, уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом, колостом;

— лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (в т.ч. холода, ветра, влажности).

## Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гастрит](#)
- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Трахеит](#)
- [Фурункул](#)
- [Царапины](#)

## Противопоказания:

*Возможно:* повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

---

## **Д-Пантенол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Крем или мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 2-4 раза/сут (при необходимости чаще). В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи ее следует предварительно обработать антисептиком.

Кормящим матерям смазывают сосок мазью после каждого кормления.

Грудным детям наносят мазь после каждой смены белья или водной процедуры.

### **Побочное действие:**

При применении по показаниям и в рекомендованных дозах побочные эффекты не наблюдались.

### **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Д-Пантенол не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение по показаниям.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Д-Пантенол не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Лечение трофических язв и плохо заживающих кожных трансплантатов должно проводиться под наблюдением врача.

Не наносить на мокнущие поверхности.

#### ***Применение в детском возрасте***

Препарат применяется у детей по показаниям.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности крема - 1.5 года, мази - 2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/D-Pantenol>