Д-Пантенол-Нижфарм



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊***Крем для наружного применения*** белого или почти белого цвета.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 100 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.8 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.2 мг, макрогола цетостеарат - 16 мг, цетостериловый спирт - 40 мг, парафин жидкий - 80 мг, вазелин - 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 0.2 мг, калия дигидрофосфат - 7.8 мг, вода очищенная - до 1 г.

25 г - тубы (1) - пачки картонные.
50 г - тубы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Относится к витаминам группы В, является производным пантотеновой кислоты. Играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов. Оказывает выраженное влияние на образование и функцию эпителиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной активностью.

Показания к применению:

Для перорального и местного применения: воспалительные заболевания полости рта, носа, гортани, дыхательных путей (в т.ч. после тонзиллэктомии), слизистой оболочки желудка, парестезии при неврологических заболеваниях, лечение дефектов слизистой зева матки.

Для парентерального применения: послеоперационная атония кишечника, паралитический илеус, недостаточность пантотеновой кислоты при синдроме мальабсорбции.

Для наружного применения: раны и ожоги; дерматиты, абсцессы, фурункулы, пролежни, опрелости; лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации; уход за грудными детьми.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Воспаление
- Дерматит
- Неврит
- Неврозы
- Ожоги
- Паралич
- Пролежни
- Раны
- Тонзиллит
- Фурункул

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к декспантенолу. Для парентерального применения - гемофилия, механическая непроходимость кишечника.

Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым - 200-400 мг/сут. Детям - 100-300 мг/сут. Парентерально (п/к, в/м, в/в) - 500 мг/сут.

Декспантенол в виде пастилок для рассасывания применяют в дозе 200-600 мг/сут.

Раствор для наружного применения применяют для полоскания рта и горла в неразбавленном или разбавленном (кипяченой водой в соотношении 1:1) виде; для ингаляций - в неразбавленном виде; для втирания в кожу головы - в неразбавленном или разбавленном (водой или спиртом в соотношении 1:3) виде.

Мазь или крем наносят на пораженную поверхность кожи 1 раз/сут; на область соска молочной железы накладывают в виде компресса; при лечении дефектов слизистой оболочки зева матки - назначают один или несколько раз/сут.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение декспантенола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном парентеральном применении декспантенола с антибиотиками, барбитуратами увеличивается риск развития аллергических реакций.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Диарея путешественников
- Инородные тела
- Кровотечения

Источник: http://drugs.thead.ru/D-Pantenol-Nizhfarm