

## Д-Пантенол Плюс Антисептик



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Крем для наружного применения** белого или почти белого цвета, однородный.

	<b>100 г</b>
декспантенол	5 г
хлоргексидина биглюконат (20% р-р)	0.776 г

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 4.5 г, ланолин - 3 г, парафин жидкий - 14 г, вазелин - 5 г, диметикон - 1 г, цетостеариловый спирт - 6.5 г, макрогола стеарат - 2.5 г, пантолактон - 0.5 г, вода - до 100 г.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное лекарственное средство для наружного применения. Оказывает противомикробное, противовоспалительное действие: улучшает регенерацию тканей.

*Декспантенол* в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

*Хлоргексидин* - антисептик, активен в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. На споры бактерий действует только при повышенной температуре. Очищает и дезинфицирует кожу, не вызывая ее повреждения. При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению.

### Показания к применению:

Небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги); инфицированные поверхностные поражения кожи; трещины сосков в период грудного вскармливания; хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни); операционные раны.

## Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Трофические язвы](#)
- [Царапины](#)

## Противопоказания:

Для обработки или лечения ушной раковины; в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства); повышенная чувствительность к декспантенолу и/или хлоргексидину.

## Способ применения и дозы:

Применяют наружно 1 или несколько раз/сут, наносят на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* возможны крапивница, зуд.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует избегать применения на больших поверхностях кожи.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Диарея путешественников
- Инородные тела
- Кровотечения

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания в глаза препаратов, содержащих декспантенол/хлоргексидин.

Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади поражения, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает, появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

