Д-пантенол-Нижфарм-ПЛЮС



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол
- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Крем для наружного применения*** белого или почти белого цвета.

	1 г
декспантенол	52.5 мг
хлоргексидина биглюконат (в форме 20% р-ра)	8.02 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 100 мг, макрогола цетостеарат (Eumulgin B2) - 16 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт не более 60%, стеариловый спирт не менее 40%) (Lanette O) - 54 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое медицинское) - 100 мг, вазелин - 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 0.2 мг, калия дигидрофосфат - 7.8 мг, вода очищенная - до 1 г.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, с противомикробной активностью для наружного применения.

Декспантенол - витамин группы В, в организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, ГКС, порфиринов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминное, метаболическое и противовоспалительное действие.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, антисептик.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus spp., а также *дрожжеподобных грибов и дерматофитов*.

Сохраняет активность в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ. Крем Депантол защищает поверхность раны от инфекцирования, подавляет течение инфекционного процесса и ускоряет заживление.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— обработка ран при опасности инфицирования (в т.ч. ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы, укусы насекомых, ожоги, трофические язвы);

— обработка послеоперационных ран;

— лечение инфицированных ран, ожогов (в т.ч. солнечных), пролежней, ссадин, порезов, трещин, трофических язв, опрелостей;

— лечение инфицированных дерматозов (в т.ч. экзема и атопический дерматит).

— пеленочный дерматит, царапины с признаками инфицирования у детей;

— трещины и воспаление сосков молочных желез с признаками инфицирования у кормящих матерей.

Относится к болезням:

- Атопический дерматоз
- Воспаление
- Дерматит
- Ожоги
- Порезы
- Пролежни
- Ссадины
- Трофические язвы
- Царапины
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Крем следует наносить тонким слоем на пораженный участок кожи 1 или несколько раз/сут по показаниям.

Кормящим матерям рекомендуется смазывать кремом инфицированную поверхность соска после кормления грудью.

Грудным детям крем наносят на места инфицирования после смены белья или водной процедуры.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации следует избегать применения препарата на обширных участках.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Хлоргексидин несовместим с мылом и другими анионными веществами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует допускать попадания крема в глаза.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/D-pantenol-Nizhfarm-PLYuS