ДОБРОКАМ



Код АТХ:

- N05CM

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бромкамфора

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки*** белого или серовато-белого цвета с вкраплениями кристаллов бромкамфоры, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, с характерным запахом камфоры.

	1 таб.
бромкамфора	250 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 41 мг, тальк - 9 мг.

25 шт. - банки (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Показания к применению:

— повышенная возбудимость;

— астения;

— кардиалгия;

— тахикардия;

— лабильность артериального давления.

Относится к болезням:

- Астения
- Кардиалгия
- Кардит
- Тахикардия

Противопоказания:

— гиперчувствительность к камфоре, бромидам или другим компонентам препарата;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— детский возраст до 7 лет.

С *осторожностью:* пациентам с нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды.

Взрослым и детям старше 14 лет - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут; **детям в возрасте 7-10 лет** - по 1 таб. 2 раза/сут; **детям в возрасте 10-14 лет** - по 1 таб. 2-3 раза/сут.

Максимальная суточная доза: для **взрослых и детей старше 14 лет** - 1.5 г; для **детей в возрасте 7-10 лет** - 0.5 г; для **детей в возрасте 10-14 лет** - 0.75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, заторможенность, сонливость, диспептические явления.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение ЦНС, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома.

Лечение: промывание желудка, назначение внутрь солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах применяют в/в диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяется по согласованию с врачом. Необходимо соотнести пользу от применения у матери и риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы принимаете другие препараты.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций

В период лечения необходимо отказаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты

психомоторных реакций.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

По истечении срока годности препарат не применять.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/DOBROKAM