# ДОНА (раствор)




## Код АТХ:

- M01AX05

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Глюкозамин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Раствор для в/м введения*** | **1 мл** | **1 амп.** |
|---|---|---|
| Глюкозамин (в форме сульфата) | 200 мг | 400 мг |

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид, лидокаина гидрохлорид, вода д/и.

*Растворитель:* диэтаноламин 24 мг, вода д/и - до 1 мл.

2 мл - ампулы темного стекла (6) в комплекте с растворителем (амп. - 6 шт.) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Дона - обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает

проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

***Фармакокинетика***

При внутримышечном введении биодоступность 95 %, быстро распространяется в тканях, $T_{1/2}$ около 60 часов, выводится, в основном, почками.

## Показания к применению:

— первичный и вторичный остеоартрит;

— остеохондроз;

— спондилоартроз.

## Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Остеохондроз
- Спондилоартрит

## Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамину, лидокаина гидрохлориду и другим компонентам препарата;

— нарушения сердечной проводимости и острая сердечная недостаточность;

— эпилептиформные судороги в анамнезе;

— тяжелые нарушения функций печени и почек;

— период беременности и лактации;

— детский возраст до 12 лет.

*С осторожностью:* пациентам с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипотонией. Следует соблюдать осторожность пациентам с аллергией на морепродукты (креветки, моллюски).

## Способ применения и дозы:

Внутримышечно! Препарат не предназначен для внутривенного введения. Перед использованием смешать раствор Б (растворитель) с раствором А (раствор препарата) в одном шприце. Приготовленный раствор препарата вводят внутримышечно по 3 мл (растворы А + Б) 3 раза в неделю на протяжении 4-6 недель. Инъекции препарата можно сочетать с приемом препарата внутрь в порошке для приготовления раствора для приема внутрь (пакетики). Продолжительность и схему лечения назначает лечащий врач.

## Побочное действие:

Переносимость препарата хорошая.

В отдельных случаях возможны: метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции - крапивница, зуд.

Из-за содержания в препарате лидокаина возможны: тошнота, рвота, сонливость, диплопия, головная боль, головокружение, онемение языка и слизистой оболочки рта, тремор, эйфория, дезориентация, нарушение сердечной проводимости.

## Передозировка:

Случаи передозировки не отмечены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано в период беременности и лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с НПВС, парацетамолом и глюкокортикостероидами.

Следует соблюдать осторожность при назначении инъекций препарата в сочетании с бета-адреноблокаторами, дигитоксином, аймалином, амнодароном, верапамилом, хинидином, новокаинамидом, гексеналом или тиопенталом натрия, ингибиторами МАО, полимиксином-В, снотворными или седативными средствами, циметидином.

## Особые указания и меры предосторожности:

При использовании препарата у пациентов с нарушенной толерантностью глюкозы, с выраженной печеночной и почечной недостаточностью необходим врачебный контроль.

***При нарушениях функции почек***

Противопоказано при тяжелых нарушениях функций почек.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказано при тяжелых нарушениях функций печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 12 лет.

## Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/DONA_rastvor