Дафнеджин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные овальной формы, кремового цвета (слоновой кости).

	1 супп.
циклопирокс оламин	100 мг

Вспомогательные вещества: бензойная кислота, глицерил монорицинолеат, масса Новата А, масса Новата С.

6 шт. - блистеры (1) в комплекте с напальчниками (6 шт.) - пачки картонные.

Крем вагинальный 1%, гомогенный, от белого до кремового цвета (слоновой кости).

	100 г
циклопирокс оламин	1 г

Вспомогательные вещества: 2-октидилдодецанол, масло петролейное, цетиловый спирт, стеариловый спирт, миристиловый спирт, диэтаноламид жирных кислот кокосового ореха, полисорбат 60, сорбитола моностеарат, бензиловый спирт, молочная кислота, вода очищенная.

78 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликаторами (6 шт.) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Препарат оказывает бактерио- и фунгистатическое действие. *Активен в отношении* Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, Candida albicans, Stopulariosus brevicaulusn, а также в отношении некоторых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению:

— для местного лечения и профилактики вульвовагинитов и вагинитов, вызванных чувствительными к препарату грибами.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Крем вагинальный вводят 1 раз/сут в течение 6 дней при помощи аппликатора, который наполняется кремом (5 г) при легком надавливании на тюбик. По рекомендации врача длительность курса лечения может быть увеличена до 14 дней.

Суппозитории вагинальные назначают по 1 шт. (100 мг) 1 раз/сут в течение 3-6 дней, в зависимости от тяжести заболевания.

При *рецидивирующих кандидозах* с целью предупреждения повторной инфекции можно обработать небольшим количеством крема вагинального перианальную и вагинальную области.

При необходимости возможно сочетанное применение лекарственных форм Дафнеджина.

Побочное действие:

Редко: зуд, жжение в месте применения препарата.

Аллергические реакции: при длительном наружном использовании препарата могут возникнуть гиперемия, отек, зуд.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Дафнеджин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации применение препарата возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Дафнеджин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При микозах влагалища рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dafnedzhin