

## [Дафнеджин \(свечи\)](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Суппозитории вагинальные** овальной формы, кремового цвета (слоновой кости).

	<b>1 супп.</b>
Циклопирокс оламин	100 мг

*Вспомогательные вещества:* бензойная кислота, глицерил монорицинолеат, масса Новата А, масса Новата С.

6 шт. - блистеры (1) в комплекте с напальчиками (6 шт.) - пачки картонные.

**Крем вагинальный 1%**, гомогенный, от белого до кремового цвета (слоновой кости).

	<b>100 г</b>
Циклопирокс оламин	1 г

*Вспомогательные вещества:* 2-октилдодецанол, масло петролейное, цетиловый спирт, стеариловый спирт, миристиловый спирт, диэтаноламид жирных кислот кокосового ореха, полисорбат 60, сорбитола моностеарат, бензиловый спирт, молочная кислота, вода очищенная.

78 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликаторами (6 шт.) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Препарат оказывает бактерио- и фунгистатическое действие. *Активен в отношении* *Trichophyton rubrum*, *Epidermophyton floccosum*, *Candida albicans*, *Storulariosus brevicaulusn*, а также в отношении некоторых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий.

### Показания к применению:

— для местного лечения и профилактики вульвовагинитов и вагинитов, вызванных чувствительными к препарату грибами.

### Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)

## **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Крем вагинальный вводят 1 раз/сут в течение 6 дней при помощи аппликатора, который наполняется кремом (5 г) при легком надавливании на тубик. По рекомендации врача длительность курса лечения может быть увеличена до 14 дней.

Суппозитории вагинальные назначают по 1 шт. (100 мг) 1 раз/сут в течение 3-6 дней, в зависимости от тяжести заболевания.

При рецидивирующих кандидозах с целью предупреждения повторной инфекции можно обработать небольшим количеством крема вагинального перианальную и вагинальную области.

При необходимости возможно сочетанное применение лекарственных форм Дафнеджина.

## **Побочное действие:**

*Редко:* зуд, жжение в месте применения препарата.

*Аллергические реакции:* при длительном наружном использовании препарата могут возникнуть гиперемия, отек, зуд.

## **Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Дафнеджин не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации применение препарата возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Дафнеджин не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При микозах влагалища рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

## **Дафнеджин (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dafnedzhin\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Dafnedzhin_svechi)