

## [Даларгин-Эллара](#)



### **Код АТХ:**

- [A02BX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Тирозил-d-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Вещество пептидной природы, синтетический гексапептид, аналог лейцинэнкефалина. Подавляет протеолиз и способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, оказывает гипотензивное действие.

### **Показания к применению:**

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- панкреатит;
- панкреонекроз;
- облитерирующие заболевания артерий;
- алкоголизм.

### **Относится к болезням:**

- [Алкоголизм](#)
- [Панкреатит](#)
- [Язвенная болезнь](#)

- [Язвенная болезнь желудка](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- артериальная гипотензия;
- острые инфекционные процессы;
- беременность.

## **Способ применения и дозы:**

При *язвенной болезни* препарат вводят в/м или в/в. Разовая доза - 1-2 мг; высшая суточная доза - 5 мг. Длительность лечения обычно составляет 3-4 нед.

В/м вводят, предварительно растворив в 1 мл 0.9% раствора натрия хлорида, 2 раза/сут. Для в/в введения препарат растворяют в 5-10 мл 0.9% раствора натрия хлорида. В/в вводят 1 раз/сут.

При *остром панкреатите* - в/в 2 мг, затем - 5 мг 1-2 раза/сут. Курс лечения - 4-6 дней.

При *панкреонекрозе* - по 5 мг 3-4 раза/сут (через 6-8 ч). Курс лечения - 2-6 дней.

Растворы для инъекций готовят непосредственно перед введением.

## **Побочное действие:**

Снижение АД, аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан при беременности.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Dalargin-Ellara>