Даларгин-Эллара



Код АТХ:

- A02BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тирозил-d-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вещество пептидной природы, синтетический гексапептид, аналог лейцинэнкефалина. Подавляет протеолиз и способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, оказывает гипотензивное действие.

Показания к применению:

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— панкреатит;

— панкреонекроз;

— облитерирующие заболевания артерий;

— алкоголизм.

Относится к болезням:

- Алкоголизм
- Панкреатит
- Язвенная болезнь

- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— артериальная гипотензия;

— острые инфекционные процессы;

— беременность.

Способ применения и дозы:

При *язвенной болезни* препарат вводят в/м или в/в. Разовая доза - 1-2 мг; высшая суточная доза - 5 мг. Длительность лечения обычно составляет 3-4 нед.
В/м вводят, предварительно растворив в 1 мл 0.9% раствора натрия хлорида, 2 раза/сут. Для в/в введения препарат растворяют в 5-10 мл 0.9% раствора натрия хлорида. В/в вводят 1 раз/сут.

При *остром панкреатите* - в/в 2 мг, затем - 5 мг 1-2 раза/сут. Курс лечения - 4-6 дней.

При *панкреонекрозе* - по 5 мг 3-4 раза/сут (через 6-8 ч). Курс лечения - 2-6 дней.

Растворы для инъекций готовят непосредственно перед введением.

Побочное действие:

Снижение АД, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dalargin-Ellara