

## [Дайвобет](#)



### Код АТХ:

- [D05AX52](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бетаметазон](#)
- [Кальципотриол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** однородная, от почти белого до бледно-желтого цвета.

	<b>1 г</b>
бетаметазона дипропионат	643 мкг,
эквивалентно бетаметазону	500 мкг
кальципотриола моногидрат	52 мкг,
эквивалентно кальципотриолу	50 мкг

*Вспомогательные вещества:* парафин жидкий, полиоксипропилен-15-стеариловый эфир,  $\alpha$ -токоферол, парафин белый мягкий.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
15 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
60 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
60 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Кальципотриол - синтетический аналог активного метаболита витамина D. Вызывает торможение пролиферации кератиноцитов и ускоряет их морфологическую дифференциацию.

Бетаметазон - глюкокортикостероид (ГКС) для наружного применения. Оказывает местное противовоспалительное, противоэдематозное, вазоконстрикторное и иммуносупрессивное действие, однако точные механизмы противовоспалительного действия топических ГКС до конца не ясны. Применение окклюзионных повязок усиливает эффект топических ГКС, т.к. при этом повышается их проникновение в собственно кожу.

### Фармакокинетика

#### Всасывание и распределение

При применении Дайвобета всасывание кальципотриола и бетаметазона через неповрежденную кожу составляет менее 1%. При нанесении препарата на псориатические бляшки и под окклюзионные повязки повышается абсорбция топического ГКС.

Поскольку в коже создается депо препарата, то его элиминация из кожи происходит в течение нескольких дней.

#### Метаболизм и выведение

Бетаметазон метаболизируется в печени и в почках с образованием глюкуронидов и сульфозэфиров, выводится через кишечник и почки.

## Показания к применению:

— хронический вульгарный бляшечный псориаз.

## Относится к болезням:

- [Псориаз](#)

## Противопоказания:

— заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция;

— выраженная почечная и печеночная недостаточность;

— вирусные (включая герпес или ветряную оспу), грибковые, бактериальные и паразитарные инфекции кожи, розацеа, розовые угри, вульгарные угри, периоральный дерматит, кожные проявления туберкулеза и сифилиса, атрофия кожи, язвы кожи, повышенная ломкость сосудов кожи, ихтиоз, перианальный и генитальный зуд;

— псориатическая эритродермия, каплевидный, эксфолиативный, пустулезный псориаз;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Дайвобет назначают **взрослым**. Наружно мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз/сут.

Максимальная дневная доза составляет не более 15 г, максимальная недельная доза не должна превышать 100 г.

Рекомендуемая продолжительность курса лечения - 4 недели. Возможно проведение повторных курсов лечения под наблюдением врача.

Площадь нанесения препарата не должна превышать 30% поверхности тела.

## Побочное действие:

---

Побочные эффекты классифицируются в зависимости от частоты встречаемости: наиболее частые ( $> 1/10$ ), частые ( $> 1/100$  и  $< 1/10$ ), нечастые ( $> 1/1000$  и  $< 1/100$ ), редкие ( $> 1/10\ 000$  и  $< 1/1000$ ), очень редкие ( $< 1/10\ 000$ ).

*Со стороны кожных покровов и придатков кожи:* частые - зуд, сыпь, ощущение жжения; нечастые - боль, раздражение, дерматит, эритема, обострение псориаза, нарушение пигментации на месте аппликации мази, фолликулит; редкие - пустулезный псориаз.

Кальципотриол может вызывать локальное раздражение кожи, зуд, жжение, острую боль, сухость кожи, эритему, сыпь, дерматит, экзему и обострение псориаза.

С длительным топическим применением бетаметазона (дипропионата) связывают развитие атрофии кожи, телеангиэктазий, стрий, фолликулита, гипертрихоза, периорального дерматита, аллергического контактного дерматита, депигментации, коллоидной дегенерации кожи, а также повышение риска развития генерализованного пустулезного псориаза, реакции гипер- и фоточувствительности, включая крайне редкие случаи ангионевротического отека и отека лица.

#### *Системные реакции:*

При применении кальципотриола очень редким побочным эффектом является гиперкальциемия или гиперкальциурия.

С топическим применением бетаметазона связывают (редкие, но иногда тяжелые, особенно при длительном применении, на больших поверхностях и при использовании окклюзионных повязок): подавление функции коры надпочечников, катаракта, инфекции, повышение внутриглазного давления.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* повышение содержания кальция в крови, подавление функции гипофизарно-надпочечниковой системы с развитием обратимой вторичной надпочечниковой недостаточности.

*Лечение:* отмена препарата; при необходимости проводят симптоматическую терапию. В случаях хронической токсичности ГКС следует отменять постепенно.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения Дайвобета при беременности и в период лактации не установлена, поэтому применение препарата возможно только тогда, когда по мнению врача терапия с его использованием необходима.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

До настоящего времени лекарственное взаимодействие препарата Дайвобет не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется наносить мазь на кожу лица, слизистые оболочки и волосистую часть головы. После применения препарата следует вымыть руки.

Риск развития гиперкальциемии при соблюдении рекомендованного режима дозирования минимален. Однако при применении Дайвобета в дозах, превышающих рекомендуемую максимальную недельную дозу (100 г), возможно развитие гиперкальциемии, быстро проходящей при снижении дозы или отмене препарата.

Дайвобет содержит сильнодействующий ГКС, поэтому не рекомендуется в период его применения проводить сопутствующее лечение другими ГКС.

Следует избегать применения препарата на обширных участках кожи, составляющих более 30% поверхности тела, а также под окклюзионную повязку, наносить в складки кожи, т.к. это повышает вероятность системного всасывания ГКС и развития системных побочных реакций.

Побочные явления, такие как супрессия гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с развитием обратимой вторичной надпочечниковой недостаточности или обострения сахарного диабета, связанные с системным назначением ГКС, могут наблюдаться и при длительном применении топических ГКС вследствие системной абсорбции.

При осложнении псориаза вторичной инфекцией следует проводить антибактериальную терапию, а при усугублении инфекции отменить препарат.

## **Дайвобет**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В период лечения Дайвобетом следует ограничивать или избегать чрезмерного воздействия естественного или искусственного солнечного света. Применение Дайвобета совместно с УФ-излучением возможно только в том случае, если потенциальная польза перевешивает потенциальный риск.

### *Использование в педиатрии*

Клинический опыт применения Дайвобета у **детей и подростков в возрасте до 18 лет** отсутствует.

### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Дайвобет не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказано назначение при выраженной почечной недостаточности.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказано назначение при выраженной печеночной недостаточности.

### **Применение в детском возрасте**

Клинический опыт применения Дайвобета у **детей и подростков в возрасте до 18 лет** отсутствует.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

После первого вскрытия тубы срок годности - 3 мес.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Dayvobet>