Дайвонекс (мазь)

Код АТХ:

- D05AX02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кальципотриол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения*** полупрозрачная, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 г
кальципотриола моногидрат	52.2 мкг,
эквивалентно кальципотриолу	50 мкг

Вспомогательные вещества: α-токоферол - 20 мкг, макрогола стеарат - 50 мг, пропиленгликоль - 100 мг, динатрия эдетата дигидрат - 65 мкг, натрия гидрофосфата дигидрат - 260 мкг, парафин жидкий - 50 мг, вода - 26 мг, парафин белый мягкий - до 1 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения псориаза.

Кальципотриол является аналогомактивного метаболита природного витамина D_3. Стимулирует морфологическую дифференциацию и подавляет пролиферацию кератиноцитов, что лежит в основе его лечебного эффекта при псориазе.

Кальципотриол является ингибитором активации Т-лимфоцитов, вызванной интерлейкином1.

Влияние кальципотриола на кальциевый обмен в 100 раз слабее, чем при применении кальцитриола.

Фармакокинетика

Трансдермальная абсорбция кальципотриола составляет от 1% до 5% от дозы. Кальципотриол подвергается быстрой биотрансформации в печени с образованием фармакологически неактивных метаболитов. $T_{1/2}$ очень короткий

Показания к применению:

— псориаз вульгарный (в т.ч. в комбинации с ацитретином, циклоспорином или кортикостероидами).

Относится к болезням:

- Псориаз

Противопоказания:

— гиперчувствительность к кальципотриолу и любому вспомогательному веществу препарата;

— заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция;

— детский возраст до 6 лет.

С *осторожностью:* гиперкальциемия, гиперкальциурия, гипервитаминоз витамина D, нефролитиаз в анамнезе, возраст старше 65 лет, острая почечная и печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Взрослым наносить мазь тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут. При необходимости частота применения препарата может быть снижена до 1 раза/сут. Комбинированное применение мази с ацитретином или циклоспорином 2 раза/сут эффективно и хорошо переносимо.

Комбинированное применение мази с ГКС осуществляется по схеме, например, мазь - утром, кортикостероид - вечером.

Максимальная суточная доза не должна превышать 15 г, а максимальная недельная доза составляет не более 100 г.

Терапевтический эффект обычно наблюдается через 1-2 недели от начала лечения. Продолжительность курса лечения не более 6-8 недель.

Детям в возрасте старше 12 лет: наносить мазь тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут, максимальная доза за неделю не должна превышать 75 г; **в возрасте от 6 до 12 лет** - наносить мазь тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза/сут; максимальная доза за неделю не более 50 г.

Побочное действие:

Данные представлены в соответствии со следующей частотой встречаемости: очень часто > 1/10; часто > 1/100 и < 1/10; нечасто > 1/1000 и < 1/100; редко > 1/10000 и < 1/1000; очень редко < 1/10000, включая отдельные случаи.

Со стороны иммунной системы: очень редко - аллергические реакции, крапивница, ангионевротический отек.

Со стороны обмена веществ: очень редко **-** гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Со стороны кожи и подкожных тканей: часто - раздражение кожи, сыпь (чешуйчатая, эритематозная, макуло-папулезная, пустулезная, буллезная), чувство жжения, сухость и шелушение кожи, зуд, эритема; нечасто -_обострение течения псориаза, экзема, контактный дерматит; очень редко **-** обратимая гиперпигментация, обратимая депигментация, обратимое развитие фотосенсибилизации, периорбитальный или отек лица.

Передозировка:

Применение препарата в дозах, превышающих рекомендованные, может вызвать повышение концентрации кальция в крови. В этом случае лечение следует прекратить.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата при беременности и в период лактации не установлена. Неизвестно, выделяется ли кальципотриол в грудное молоко. Следует избегать применения при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Дайвонексмазь нельзя использовать вместе с препаратами для местного применения, содержащими салициловую кислоту.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется наносить мазь Дайвонекс на лицо. Во избежание контакта препарата с кожей лица руки следует тщательно мыть после каждого применения мази.

Назначение пациентам моложе 18 лет возможно только короткими курсами и на кожную поверхность, не превышающую 30% всей поверхности тела.

Не следует наносить на большие поверхности поражений (более 30% поверхности кожи). Не рекомендуется использовать на обширных кожных поверхностях или при тяжелой хронической форме псориаза (вследствие повышения интенсивности всасывания и увеличения риска возникновения гиперкальциемии). Если возникает необходимость применения при указанных формах псориаза, то требуется тщательный мониторинг концентрации кальция в крови и моче.

Гиперкальциемия может развиться при превышении максимальной недельной дозы кальципотриола. При отмене препарата концентрация кальция в крови быстро нормализуется.

В случае применения мази вместе с раствором следует учитывать, что суммарная доза кальципотриола не должна превышать 5 мг в неделю (1 мл раствора Дайвонекс для кожи головы соответствует 1 г мази Дайвонекс).

Во время лечения препаратом Дайвонекс врачи рекомендуют пациентам ограничивать или избегать чрезмерного воздействия естественного или искусственного солнечного света. Лечение можно сочетать с селективной и ПУВА – фототерапией, а также с лечением с УФ-светом, если врач считает, что потенциальная польза перевешивает потенциальный риск.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Кальципотриол не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* острая почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* острая печеночная недостаточность.

Применение в пожилом возрасте

С *осторожностью:* возраст старше 65 лет.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

Назначение пациентам моложе 18 лет возможно только короткими курсами и на кожную поверхность, не превышающую 30% всей поверхности тела.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dayvoneks_maz