

## [Дайвонекс \(раствор\)](#)



### **Код АТХ:**

- [D05AX02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Кальцитриол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Синтетический аналог наиболее активного метаболита природного витамина D<sub>3</sub>. Вызывает дозозависимое торможение пролиферации кератиноцитов (значительно повышенной у больных псориазом) и ускоряет их морфологическую дифференциацию. Оказывает незначительное влияние на метаболизм кальция в организме.

### **Показания к применению:**

Псориаз.

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к кальцитриолу.

### **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно на пораженные участки кожи 2 раза/сут. Максимальная суточная доза составляет 15 г, а недельная - 100 г. Обычно терапевтический эффект развивается в течение 1-2 недель лечения. Продолжительность курса терапии - не более 6-8 недель.

## **Побочное действие:**

*В отдельных случаях:* преходящее раздражение кожи; при применении в дозах, превышающих рекомендуемые - гиперкальциемия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение при беременности.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется нанесение на кожу лица. У детей применяют с осторожностью.

Не следует применять вместе с препаратами салициловой кислоты для наружного применения.

### ***Применение в детском возрасте***

У детей применяют с осторожностью.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dayvoneks\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Dayvoneks_rastvor)