Дефислёз

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли глазные*** в виде прозрачной или слегка опалесцирующей, бесцветной или слабо окрашенной жидкости.

	1 мл
гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)	3 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид (100 мкг/мл), натрия хлорид (2 мг/мл), динатрия эдетат (1 мг/мл), натрия фосфат однозамещенный двуводный (3.5 мг/мл), натрия фосфат двузамещенный 12-водный (24 мг/мл), вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протектор эпителия роговицы. Оказывает увлажняющее и защитное действие по отношению к роговице при пониженной секреции слезной жидкости. Обладая высокой вязкостью, увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам.

Восстанавливает, стабилизирует и воспроизводит оптические характеристики слезной пленки.

Субъективное и объективное улучшение состояния (уменьшение гиперемии, эпителизация очагов поражения) обычно наступает в течение 3-5 дней, выраженное улучшение или полное излечение - в течение 2-3 недель.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Дефислёз не предоставлены.

Показания к применению:

— эрозия и трофические язвы роговицы;

— микротравмы эпителия роговицы;

— буллезные дистрофические изменения роговицы;

— кератопатия;

— эктропион;

— лагофтальм;

— деформация век;

— состояние после пластических операций на веках;

— состояние после термических и химических ожогов роговицы и конъюнктивы;

— состояние после кератопластики, кератоэктомии;

— заместительная терапия при пониженной секреции слезной жидкости;

— синдром сухого глаза (синдром Шегрена), ксероз, кератоз (в составе комбинированной терапии);

— повышенная чувствительность глаз;

— по окончании проведения диагностических процедур: гониоскопия, электроретинография, электроокулография, эхобиометрическое исследование глазного яблока.

Относится к болезням:

- Кератит
- Конъюнктивит
- Синдром сухого глаза

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется применение препарата в острой фазе ожога (до момента полного удаления токсического вещества).

Способ применения и дозы:

Препарат следует закапывать по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 4-8 раз/сут. При необходимости можно вводить по 1-2 капли каждый час. Курс лечения - 2-3 недели.

Побочное действие:

Местные реакции: чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора), аллергические реакции.

Передозировка:

При применении глазных капель Дефислёз передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данных о возможности и безопасности использования препарата при беременности и в период лактации нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Дефислёз фармацевтически несовместим с глазными каплями, содержащими соли металлов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется ношение мягких контактных линз в период применения препарата. При ношении жестких (твердых) контактных линз перед закапыванием препарата их следует вынуть и снова установить не ранее, чем через 20-30 мин после применения препарата.

Не рекомендуется длительное применение препарата Дефислёз.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Сразу после инстилляции возможна нечеткость зрительного восприятия, что может повлечь за собой затруднения в управлении транспортными средствами или при работе с механизмами. Поэтому приступать к выполнению работы, требующей четкости зрения, следует не ранее, чем спустя 15 мин после инстилляции.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Defislyoz