

## [Декарис](#)



### Код АТХ:

- [P02CE01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левамизол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** плоские, почти белого цвета, с фаской, с гравировкой "DECARIS 150" на одной стороне.

	<b>1 таб.</b>
левамизола гидрохлорид	177 мг,
что соответствует содержанию левамизола	150 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, сахароза, тальк, повидон, магния стеарат.

1 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

**Таблетки** круглые, плоские, светло-оранжевого цвета, с фаской, с меткой "+" на одной стороне, с легким абрикосовым запахом.

	<b>1 таб.</b>
левамизола гидрохлорид	59 мг,
что соответствует содержанию левамизола	50 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, натрия сахаринат, тальк, повидон, ароматизатор абрикосовый, магния стеарат, краситель солнечный закат желтый (E110).

2 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Левамизол - противогельминтный препарат. Действуя на ганглиоподобные образования нематод, Декарис вызывает деполяризирующую нейромышечную парализацию мембраны мышц гельминтов, блокирует сукцинатдегидрогеназу, угнетает фумаратдегидрогеназу, нарушая течение биоэнергетических процессов гельминтов. Таким образом, парализованные нематоды удаляются из организма нормальной перистальтикой кишечника в течение 24 часов после приема препарата.

### Фармакокинетика

Левамизол при приеме внутрь в дозе 50 мг быстро всасывается из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови определяется в среднем через 1.5-2 ч после приема препарата. Левамизол подвергается интенсивному метаболизму в печени, основные его метаболиты - п-гидрокси-левамизол и его глюкуронид.

$T_{1/2}$  из организма составляет 3-6 ч. В неизменном виде почками выделяется менее 5 %, через кишечник менее, чем 0.2% от введенной дозы.

## Показания к применению:

— заражения гельминтами *Ascaris lumbrocoides*, *Necator* и *Americanus Ancylostoma duodenale*.

## Противопоказания:

— агранулоцитоз, вызванный лекарственными средствами (в анамнезе);

— детский возраст до 3 лет;

— период грудного вскармливания.

Таблетки 150 мг не назначают детям!

С осторожностью: больные с почечной и/или печеночной недостаточностью, при угнетении костномозгового кроветворения.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначается однократно 1 таблетка 150 мг. **Детям в возрасте от 3 до 6 лет** (10-20 кг) - 25-50 мг (0.5-1 таблетка по 50 мг); **детям в возрасте от 6 до 10 лет** (20-30 кг) 50-75 мг (1- 1.5 таблетки по 50 мг), **детям в возрасте от 10 до 14 лет** (30-40 кг) - 75-100 мг (1.5-2 таблетки по 50 мг) однократно.

Препарат целесообразно принимать после еды с небольшим количеством воды, вечером. Нет необходимости в приеме слабительных или специальной диете. При необходимости прием препарата можно повторить через 7-14 дней.

## Побочное действие:

Головная боль, бессонница, головокружение, ощущение сердцебиения, судороги, диспепсические явления (тошнота, рвота, боли в животе, диарея).

Имеются сообщения о развитии побочных эффектов со стороны ЦНС (энцефалопатии) через 2-5 недель после приема препарата, а также об аллергических реакциях (кожная сыпь), судорогах.

У большинства пациентов эти явления были обратимыми, и раннее применение глюкокортикостероидной терапии улучшала прогноз.

Связь этих симптомов с приемом Декариса не вполне убедительна. При применении больших доз или при длительной терапии может наблюдаться лейкопения, агранулоцитоз, тремор.

## **Передозировка:**

Симптомы: при введении большой дозы левамизола (свыше 600 мг) были описаны следующие признаки интоксикации: тошнота, рвота, сонливость, судороги, понос, головная боль, головокружение и спутанность сознания.

Лечение: при случайной передозировке и если после приема препарата не прошло много времени, проводится промывание желудка. Необходим мониторинг жизненно важных функций организма и проведение симптоматической терапии.

При наличии признаков антихолинэстеразного действия можно ввести атропин.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Назначение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме препарата со спиртными напитками наблюдаются дисульфирамоподобные явления.

Требуется осторожность при применении Декариса с препаратами, влияющими на кроветворение.

При одновременном приеме препарата с кумариноподобными антикоагулянтами протромбиновое время может увеличиться, поэтому необходимо скорректировать дозу перорального антикоагулянта. Декарис увеличивает уровень фенитоина в крови, поэтому при одновременном их применении необходимо контролировать уровень фенитоина в крови.

Декарис нельзя одновременно применять с липофильными препаратами, такими как тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, масло хеноподия, хлороформ или эфир, так как его токсичность может усилиться.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время и после приема препарата в течение 24 часов нельзя употреблять спиртные напитки. Нет достаточных данных о том, что левамизол, применяемый в качестве антигельминтного средства, угнетает нервную систему.

Влияние препарата на способность управлять автомобилем и другими механизмами:

в связи с тем, что при приеме препарата может возникнуть преходящее, слабо выраженное головокружение следует соблюдать осторожность при вождении автомобиля или при работе с механизмами в течение всего курса лечения.

### ***При нарушениях функции почек***

Препарат с осторожностью назначается больным с почечной недостаточностью.

### ***При нарушениях функции печени***

Препарат с осторожностью назначается больным с печеночной недостаточностью.

### ***Применение в пожилом возрасте***

Данные об назначении Декариса лицам пожилого возраста не предоставлены.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Таблетки 150 мг не назначают детям!

## **Условия хранения:**

Условия хранения:

## **Декарис**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

хранить при температуре 15-30 °С в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

5 лет.

Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Dekaris>