

## [Дексалгин \(гранулы\)](#)



### Код АТХ:

- [M01AE17](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декскетопрофен](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Раствор для внутривенного внутримышечного и введения, 25 мг/мл. По 2 мл препарата в ампулах темного стекла (тип I) с белой точкой в верхней части ампулы. По 5 амп. в упаковке контурной пластиковой (поддон) в картонной пачке.

### Состав:

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения	1 амп.
<i>активное вещество:</i>	
декскетопрофена трометамол	73,8 мг
(соответствует 50 мг декскетопрофена)	
<i>вспомогательные вещества:</i> этанол 96% — 200 мг; натрия хлорид — 8 мг; натрия гидроксид — до pH 7,4; вода для инъекций — до 2 мл	

### Описание:

Прозрачный бесцветный раствор с характерным запахом спирта.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — жаропонижающее, противовоспалительное, анальгезирующее.

#### Фармакодинамика

Декскетопрофена трометамол — действующее вещество препарата Дексалгин® — НПВС, оказывающее анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза ПГ на уровне ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

Анальгезирующее действие наступает через 30 мин после парентерального введения. Продолжительность анальгезирующего эффекта после введения в дозе 50 мг составляет 4–8 ч.

При комбинированной терапии с анальгетиками опиоидного ряда декскетопрофена трометамол значительно (до 30–45%) снижает потребность в опиоидах.

#### Фармакокинетика

После приема препарата внутрь  $C_{max}$  декскетопрофена у человека достигается в среднем через 30 мин (15–60 мин). Связывание с белками плазмы - 99%. Средний  $V_d$  - менее 0.25 л/кг.  $T_{1/2}$  составляет 1.65 ч. Подвергается метаболизму. Выводится главным образом почками в виде метаболитов.

### Показания к применению:

Болевой синдром легкой и средней интенсивности при следующих заболеваниях и состояниях: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); дисменорея; зубная боль.

### Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Дисменорея](#)
- [Зубная боль](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Ревматоидный артрит](#)
- [Спондилоартрит](#)

### Противопоказания:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, активные кровотечения различного генеза, повышенная кровоточивость, терапия антикоагулянтами, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе), тяжелая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, беременность, лактация, повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим НПВС.

### Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Средняя рекомендуемая разовая доза составляет 12.5 мг - 1-6 раз/сут каждые 4-6 ч по мере необходимости или 25 мг 1-3 раза/сут каждые 8 ч.

*Максимальная суточная доза* составляет 75 мг. Длительность применения - не более 3-5 дней.

Для пациентов с нарушениями функции печени или почек, лиц пожилого возраста начальная доза - не более 50 мг/сут.

### Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* изжога, боли в животе; редко - эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

*Со стороны нервной системы:* головные боли, головокружение, нервозность, нарушение сна, парестезии.

## **Дексалгин (гранулы)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* сердцебиение, повышение АД.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, бронхоспазм.

*Прочие:* озноб, отеки конечностей, фотосенсибилизация; редко - изменение картины периферической крови, нарушения функции почек.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, анорексия, абдоминальная боль, головная боль, головокружение, дезориентация, бессонница.

*Лечение:* симптоматическая терапия; при необходимости — промывание желудка, диализ.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период лактации противопоказано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении декскетопрофена с другими НПВС возможно повышение риска развития побочных эффектов.

При одновременном применении с препаратами лития возможно повышение концентрации последнего в плазме крови.

С осторожностью применять декскетопрофен менее чем за 24 ч до начала применения или после окончания терапии метотрексатом, т.к. концентрация последнего в плазме крови (и, следовательно, токсичность) может повышаться.

Описаны отдельные случаи возникновения кровотечений при одновременном применении НПВС и антикоагулянтов.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста, пациентам с аллергическими реакциями, с системными заболеваниями соединительной ткани и пациентам с нарушением кроветворения.

Следует проинформировать пациентов, что в случае появления побочных эффектов, а также при отсутствии клинического эффекта в течение 3-5 дней лечения необходимо сообщить об этом лечащему врачу.

Требуется особая осторожность при одновременном применении декскетопрофена с фенитоином, сульфонидами и препаратами, снижающими свертываемость крови.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Поскольку декскетопрофен может вызвать снижение способности к концентрации внимания, следует с осторожностью применять у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Deksalgin\\_granuly](http://drugs.thead.ru/Deksalgin_granuly)