

[Декспантенол-Хемофарм](#)



Код АТХ:

- [D03AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Мазь для наружного применения 5%** гомогенная, от белого до светло-желтого цвета.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: глицерол, вазелин, ланолин, парафин жидкий, парафин твердый, стеариловый спирт, цетиловый спирт, вода.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Декспантенол - производное пантотеновой кислоты. Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью кофермента А и участвует в процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов.

Кроме того, принимает участие практически во всех метаболических процессах (цикл трикарбоновых кислот, обмен углеводов, жиров и жирных кислот, фосфолипидов, белков), стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с

белками плазмы (главным образом, с бета-глобулином и альбумином). Концентрация в крови - 0.5-1 мг/л, в сыворотке крови - 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

- сухость кожи;
- нарушение целостности кожных покровов и мягких тканей;
- мелкие повреждения;
- ожоги (термические и солнечные);
- ссадины;
- буллезный дерматит;
- абсцесс;
- фурункул;
- трофические язвы голени;
- пролежни;
- трещины;
- асептические послеоперационные раны;
- плохо приживающиеся кожные трансплантаты;
- лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы в период лактации;
- уход за грудными детьми;
- профилактика и лечение опрелости;
- заживление кожи при мелких повреждениях;
- эритемы от пеленок у грудных детей.

Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Воспаление](#)
- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Фурункул](#)
- [Эритема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Для лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов, для ухода за грудью, грудными детьми - 5% мазь 2-3 раза/сут наносят на пораженную поверхность тонким слоем и слегка втирают в зависимости от показаний; на область соска молочной железы мазь накладывают в виде компресса после каждого кормления грудью.

Грудным детям Декспантенол наносят на спину, ягодицы и паховую область после каждой смены белья или водной

процедуры.

Побочное действие:

Возможно возникновение аллергических реакций, при их появлении прекратить применение препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Может применяться во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение плохо заживающих кожных трансплантатов и трофических язв должно проводиться под наблюдением лечащего врача.

Не наносить на мокнущие раны.

Применение в детском возрасте

Для лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов грудными детьми - 5% мазь 2-3 раза/сут наносят на пораженную поверхность тонким слоем и слегка втирают в зависимости от показания.

Грудным детям Декспантенол наносят на спину, ягодицы и паховую область после каждой смены белья или водной процедуры.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15° до 25°С . Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Dekspantenol-Hemofarm>